Инструкция по применению
Кармолис Капли 80 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Д-р А. и Л. Шмидгалл
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Масла эфирные
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Описание

Кармолис Капли – натуральный лекарственный препарат на основе эфирных масел десяти лекарственных растений (аниса, коричника китайского, гвоздики, лимона, лаванды, мелиссы, тимьяна, шалфея, мяты перечной, мускатного ореха). Эфирные масла производятся методом двойной аквадистилляции – это позволяет извлечь лёгкие фракции масел без посторонних примесей, что значительно снижает риск развития аллергических реакций. Рецепт препарата Кармолис Капли известен более 400 лет. С 1611 года по Европе распространилась слава о « кармелитской воде» – рецепт составили монахи ордена кармелитов и столетиями держали его в тайне. В XIX веке кармелиты передали рецепт официальной медицине, и «кармелитская вода» появилась в Государственных Фармакопеях Европы, а в 1880 году – России. С 1953 года рецепт принадлежит австрийской компании «Д-р А. и Л. Шмидгалл» – фармацевтическому холдингу, выпускающему натуральные препараты под брендом «Кармолис». Для профилактики ОРВИ и гриппа, в комплексной терапии заболеваний Кармолис Капли принимают внутрь с тёплым питьём, а также делают ингаляции с добавлением препарата.

Действующее вещество

Масла эфирные

Состав

Активные компоненты: Левоментол (L-ментол) 1,20, Кармоловое масло «Fluid» 5,60, которое состоит из: Сосны обыкновенной масло 1,01, Метилсалицилат 0,90, Камфора рацемическая 0,56, Эвкалипта листьев масло 0,56, Скипидарное масло 0,45, Лаванды масло 0,23, Розмарина масло 0,23, Тимьяна обыкновенного травы масло 0,11, Мяты индийской масло 0,09, Шалфея масло 0,08, Ореха мускатного масло 0,07, Аниса масло 0,05, Гвоздики цветков масло 0,04. Вспомогательные вещества: Гидроксипропиловая смола (Jaguar C-162) 0,25, изопропанол (изопропиловый спирт) 64,10, Вода очищенная 30,07.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей сопровождающихся кашлем, при диспепсических явлениях (тошнота, тяжесть в эпигастральной области, метеоризм), при повышенной нервной возбудимости и раздражительности, чувстве внутреннего напряжения, в комплексной терапии артралгии (в том числе при ревматизме), миалгии различного генеза, неврита седалищного нерва, при головной боли, при кожном зуде, укусах насекомых.

Способ применения и дозы

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей: Внутрь принимают по 10-20 капель (0, 5 - 1, 5 мл) на стакан теплой воды или на кусок сахара до 5 раз в сутки. Для ингаляций добавляют 25-30 капель(2, 0 - 2, 5 мл) к 1 литру горячей воды, перемешивают и дышат паром под полотенцем. Наружно - при кашле (сухом и влажном) препарат наносят на кожу груди и межлопаточную область, хорошо растирают, после чего указанные области закрывают теплой тканью. При диспепсических явлениях и в качестве седативного средства - Внутрь - принимают 3 - 4 раза в сутки по 10-20 капель (0, 5 , 1, 5 мл) на стакан воды или на кусок сахара. При артралгиях, миалгиях, люмбаго, ишиасе - препарат используют наружно - для растирания болезненных участков. После втирания препарата болезненный участок рекомендуется держать в тепле (прикрыть согревающей повязкой). При головной боли неразбавленный препарат применяют наружно - втирают в кожу височной области и лба. При укусах насекомых, кожном зуде препарат применяют наружно - смазывают больные участки, не втирая 2-3 раз в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхоспазм, холецистит, обтурация желчевыводящих путей, заболевания печени, тяжелая почечная и или печеночная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кармолис не предоставлены.

Особые указания

После использования форм для наружного применения следует тщательно мыть руки. Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки, в глаза - возможен ожог (в этом случае необходимо промыть глаза большим количеством воды). Кармолис капли: содержит 65% спирта; при соблюдении рекомендуемых доз при каждом приеме внутрь в организм поступает 0, 54 г этанола. Кармолис жидкость: предназначен только для наружного применения. Не следует наносить на открытые и кровоточащие раны, большие поверхности кожи в течение длительного времени. Не следует использовать для компрессов, повязок.

Условия хранения

В сухом месте