Инструкция по применению
Кармолис Раствор для наружного применения 250 мл

Характеристики

Форма выпуска: Лосьон
Страна: Швейцария
Производитель: Иромедика АГ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Масла эфирные
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Описание

Кармолис Жидкость – натуральный лекарственный препарат, применяющийся при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит, невралгия, миалгия) и травмах различного происхождения (ушибы, вывихи, растяжения). Кармолис Жидкость способствует уменьшению воспалительных явлений, быстро впитывается и не оставляет следов на одежде. Рекомендована к применению Ассоциацией ревматологов России. В составе препарата скомбинированы эфирные масла с высоким содержанием обезболивающих, спазмолитических, противовоспалительных компонентов (сосна, эвкалипт, розмарин, лаванда, тимьян, мята, шалфей, мускатный орех, анис, гвоздика). А также – метилсалицилат, камфора рацемическая, скипидарное масло, усиливающие эффект эфирных масел. У препарата Кармолис Жидкость – водно-спиртовая основа, что способствует более глубокому проникновению активных веществ в болезненную область. Для получения максимального эффекта рекомендуется чередовать применение препаратов Кармолис Жидкость и Кармолис Гель.

Действующее вещество

Масла эфирные

Состав

Активные компоненты: Левоментол (L-ментол) 1,20, Кармоловое масло « Fluid» 5,60, которое состоит из: Сосны обыкновенной масло 1,01, Метилсалицилат 0,90, Камфора рацемическая 0,56, Эвкалипта листьев масло 0,56, Скипидарное масло 0,45, Лаванды масло 0,23, Розмарина масло 0,23, Тимьяна обыкновенного травы масло 0,11, Мяты индийской масло 0,09, Шалфея масло 0,08, Ореха мускатного масло 0,07, Аниса масло 0,05, Гвоздики цветков масло 0,04. Вспомогательные вещества: Гидроксипропиловая смола (Jaguar C-162) 0,25, изопропанол (изопропиловый спирт) 64,10, Вода очищенная 30,07.

Форма выпуска

Лосьон

Показания

Применяется в качестве местнообезболивающего (отвлекающего) и противовоспалительного средства при травмах опорно-двигательного аппарата и мягких тканей (растяжения связок и сухожилий, ушибы).

Способ применения и дозы

наносить препарат на болезненную область до 5 раз в день с последующим массажем этой области. Курс лечения до 2-3 недель, если врач не назначил иную схему применения.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушения функции почек, период беременности, грудного вскармливания, детский возраст (до 12 лет); нарушение целостности кожных покровов, дерматологические заболевания в местах предполагаемого нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, раздражение кожи (краснота, зуд).

Передозировка

Случаев передозировки, при применении препарата согласно инструкции, не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, таким образом, совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их эффекта.

Особые указания

Препарат предназначен только для наружного применения. Недопустимо попадание препарата в глаза, на слизистые оболочки. Не применять препарат на открытые и кровоточащие раны. Не использовать препарат для компрессов, повязок. Не следует наносить препарат на большие поверхности кожи в течение длительного времени. Следует тщательно мыть руки после применения препарата. Если препарат оказывает слишком слабое или слишком сильное действие – обратитесь за консультацией к врачу.

Условия хранения

Беречь от детей