Инструкция по применению
Кармолис Капли 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Масла эфирные
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Действующее вещество

Масла эфирные

Состав

На 100 мл препарата: Активные компоненты: Левоментол 1 538,00 мг; Кармоловое масло “Carmol Drops Oil” 769,00 мг, которое состоит из эфирных масел: Китайского коричника масло 158,40 мг; Гвоздики цветков масло 158,40 мг; Лаванды масло 158,40 мг; Л аванды пряной масло 158,40 мг; Ореха мускатного масло 63,00 мг; Шалфея масло 31,60 мг; Цитронеллы масло 15,40 мг; Аниса масло 13,90 мг; Лимона масло 10,00 мг; Тимьяна обыкновенного травы масло 1,50 мг. Вспомогательные вещества: Этанол (спирт этиловый) 96%; Вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Показания

в комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей, в том числе сопровождающихся кашлем; при диспепсических явлениях (тошнота, тяжесть в эпигастральной области, метеоризм); при повышенной нервной возбудимости и раздражительности, чувстве внутреннего напряжения; в комплексной терапии артралгии (в том числе при ревматоидном артрите), миалгии различного генеза, неврита седалищного нерва; при головной боли; при кожном зуде, укусах насекомых.

Способ применения и дозы

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей: – Внутрь принимают по 10-20 капель (0,5-1,0 мл) на стакан теплой воды или на кусочек сахара до 5 раз в сутки. Курс лечения – 5-7 дней. – Для ингаляций добавляют 25-30 капель (1,25-1,5 мл) к 1 литру горячей воды, перемешивают и дышат паром под полотенцем. Курс лечения – 5-7 дней. – Наружно – при кашле (сухом и влажном) препарат наносят на кожу груди и межлопаточную область, хорошо растирают, после чего указанные области закрывают теплой тканью. Курс лечения – 5-7 дней. При диспепсических явлениях и в качестве седативного средства – Внутрь – принимают 3-4 раза в сутки по 10-20 капель (0,5-1,0 мл) на стакан воды или на кусочек сахара. Курс лечения не должен превышать 4-х недель. При артралгиях, миалгиях, люмбаго, ишиасе препарат используют наружно – для растирания болезненных участков. После втирания препарата болезненный участок рекомендуется держать в тепле (прикрыть согревающей повязкой). Курс лечения не должен превышать 4-х недель. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции При головной боли неразбавленный препарат применяют наружно – втирают в кожу височной области и лба. Курс лечения – 1-2 дня. При укусах насекомых, кожном зуде препарат применяют наружно – смазывают больные участки, не втирая 2-3 раза в день. Курс лечения – 1-2 дня.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхоспазм, холецистит, обтурация желчевыводящих путей, заболевания печени, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст (до 18 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

После применения препарата для растирания следует тщательно мыть руки. Следует избегать контакта препарата с глазами, так как при попадании препарата в глаза возможен ожог глаз. В этом случае следует промыть глаза большим количеством воды. Препарат содержит 65% этилового спирта. При соблюдении рекомендованных доз при каждом приеме внутрь в организм поступает до 0,54 г абсолютного этилового спирта. При приеме внутрь в максимальной суточной дозе препарата содержится 2,7 граммов абсолютного этилового спирта. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: При применении препарата следует воздержаться от занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управления транспортными средствами, работы с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке (флакон в пачке). Хранить в недоступном для детей месте!