**Инструкция по применению**
**Карницетин Капсулы 60 шт**

## Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ПИК-Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ацетилкарнитин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 295 мг




## Действующее вещество

Ацетилкарнитин

## Состав

Ацетилкарнитина гидрохлорид 295 мг,;что соответствует содержанию ацетилкарнитина 250 мг;Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 38 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил А-300) - 5 мг, магния стеарат - 2 мг.;Состав оболочки капсулы: титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.

## Форма выпуска

Капсулы

## Фармакокинетика

В исследованиях на животных при пероральном приеме (500 мг/кг) максимальная концентрация препарата в крови наступает через 4 ч и составляет 40 μМ/л в течение 8 ч. Всасывание АЛК из ЖКТ происходит за счет активного транспорта или путем простой диффузии через слизистую оболочку (при условии его высокой концентрации). В большинство тканей, включая церебральную, АЛК поступает из кровеносного русла (исключение составляют печень и тонкий кишечник) в неизмененном виде. В клетку АЛК поступает за счет прямого энергозависимого процесса против градиента концентрации. Выводится из организма почками.

**Показания**

— начальная деменция альцгеймеровского типа (болезнь Альцгеймера) и церебрально-сосудистая деменция; — периферическая невропатия различной этиологии; — первичные и вторичные инволюционные синдромы на фоне сосудистой энцефалопатии; — снижение умственной работоспособности, для улучшения концентрации внимания и памяти.

**Способ применения и дозы**

Карницетин принимают внутрь. Разовая доза для взрослых обычно составляет 1-4 капсулы, суточная доза 6-12 капсул. Курс лечения - 1-4 мес.

**Противопоказания**

— индивидуальная повышенная чувствительность к препарату; — возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Специальных исследований о возможности применения при беременности и в период грудного вскармливания не проводилось. Препарат применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, тошнота, изжога.

**Передозировка**

Случаи передозировки не зарегистрированы.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Случаи лекарственного взаимодействия не отмечены.