
Инструкция по применению
Карсил Драже 35мг 80 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Расторопши пятнистой плодов экстракт
Количество в упаковке: 80
Дозировка действующего вещества: 35 мг
Срок годности: 24.0





Действующее вещество

Расторопши пятнистой плодов экстракт

Состав

Действующее вещество: расторопши пятнистой плоды (Cardui mariae fructus)
Концентрация действующего вещества (мг): 35 мг

Форма выпуска

Драже

Фармакокинетика

ВсасываниеПосле применения внутрь силимарин не полностью всасывается из ЖКТ (до 23-47%). Cmax в плазме достигается через 4-6 ч после применения внутрь однократной дозы.РаспределениеПри исследованиях с 14С меченным силибинином самые высокие концентрации устанавливаются в печени, легких, желудке и поджелудочной железе и в незначительных количествах в почках, сердце и других органах.МетаболизмПодвергается кишечно-печеночной рециркуляции. Метаболизируется в печени путем конъюгации с сульфатами и глюкуроновой кислотой. В качестве метаболитов в желчи обнаружены глюкурониды и сульфаты. ВыведениеТ1/2 составляет 1-3 ч для неизмененного силимарина и 6-8 ч для его метаболитов. Выводится в основном с желчью (около 80%) в форме глюкуронидов и сульфатов, в незначительной степени (около 5%) почками в неизмененном виде. Не кумулирует.

Показания

токсические повреждения печени; хронический гепатит невирусной этиологии;цирроз печени (в составе комплексной терапии);состояние после перенесенного острого гепатита; в целях профилактики при длительном приеме лекарств, алкоголя, при хронических интоксикациях (в т.ч. профессиональных).

Способ применения и дозы

В профилактических целях препарат назначают в суточной дозе 2-3 драже (70-105 мг). Продолжительность курса лечения составляет не менее 90 дней.Детям в возрасте старше 12 лет препарат назначают в суточной дозе из расчета 5 мг/кг массы тела, разделенной на 2-3 приема.Драже принимают внутрь не разжевывая.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к расторопше пятнистой,детский возраст до 12 лет;

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия, диарея.Дерматологические реакции: в отдельных случаях - алопеция, кожные проявления аллергических реакций. Прочие: в отдельных случаях - обострение существующих вестибулярных нарушений.

Передозировка

Данные о случаях передозировки ограничены.Лечение: в случае передозировки следует проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сведений о лекарственном взаимодействии препарата .

Особые указания

Имеется сообщение об антагонистическом взаимодействии силимарина с иохимбином и фентоламином.

Условия хранения

Беречь от детей