
Инструкция по применению
Карсил форте Капсулы 90 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Расторопши пятнистой плодов экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 90 мг
Срок годности: 36.0





Действующее вещество

Расторопши пятнистой плодов экстракт

Состав

Сухой экстракт плодов расторопши пятнистой 163.6-225 мг, эквивалент 90 мг силимарина, лактозы моногидрат - 38.2-7.5 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101) - 38.2-7.5 мг, крахмал пшеничный - 15.5 мг, повидон К25 - 3.7 мг, полисорбат 80 - 3.7 мг, кремния диоксид коллоидный безводный - 3.4 мг, маннитол - 80 мг, кросповидон - 14 мг, натрия гидрокарбонат - 6 мг, магния стеарат - 3.7 мг.Состав оболочки капсулы: железа оксид черный - 0.02%, железа оксид красный - 0.03%, титана диоксид - 0.6666%, железа оксид желтый - 0.35%, желатин - до 100%

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

ВсасываниеПосле применения внутрь силимарин не полностью всасывается из ЖКТ (до 23-47%). Cmax в плазме достигается через 4-6 ч после применения внутрь однократной дозы.РаспределениеПри исследованиях с 14С меченным силибинином самые высокие концентрации устанавливаются в печени, легких, желудке и поджелудочной железе и в незначительных количествах в почках, сердце и других органах.МетаболизмПодвергается кишечно-печеночной рециркуляции. Метаболизируется в печени путем конъюгации с сульфатами и глюкуроновой кислотой. В качестве метаболитов в желчи обнаружены глюкурониды и сульфаты. ВыведениеТ1/2 составляет 1-3 ч для неизмененного силимарина и 6-8 ч для его метаболитов. Выводится в основном с желчью (около 80%) в форме глюкуронидов и сульфатов, в незначительной степени (около 5%) почками в неизмененном виде. Не кумулирует.

Показания

В составе комплексной терапии:- токсического поражения печени;- состояний после перенесенного острого гепатита;- хронического гепатита невирусной этиологии;- стеатоза печени (не алкогольного и алкогольного);- цирроза печени;- профилактики печеночных поражений при продолжительном приеме лекарств, алкоголя, при хронической интоксикации (в т.ч. профессиональной).

Способ применения и дозы

Капсулы принимают внутрь, запивая достаточным количеством воды.Лечение тяжелых поражений печени начинается с дозы 1 капсула 3 раза/сутки. При более легких и среднетяжелых случаях доза составляет по 1 капсуле 1-2 раза в сутки.Для профилактики химических интоксикаций - 1-2 капсулы в сутки. Курс лечения продолжается не менее 3 месяцев.

Противопоказания

- гиперчувствительность к активному или любому из вспомогательных веществ;- дети младше 12 лет;- лактазная недостаточность, галактоземия или синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы (из-за наличия в составе лактозы).- целиакия (глютеновая энтеропатия) (из-за наличия в составе пшеничного крахмала).С осторожностью: назначают пациентам с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичников и матки, карцинома предстательной железы) из-за возможного проявления эстрогеноподобного эффекта силимарина.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Лекарственный препарат хорошо переносится. Побочные реакции наблюдаются очень редко и они, как правило, легкие и преходящие.Нежелательные побочные реакции классифицированы по частоте и по системно-органным классам.Со стороны иммунной системы: очень редко - кожные аллергические реакции - зуд, сыпь; с неизвестной частотой - анафилактический шок.Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: редко - усиление существующих вестибулярных нарушений.Со стороны ЖКТ: редко - диарея в результате усиленной функции печени и желчного пузыря; с неизвестной частотой - тошнота, рвота, диспепсия, уменьшение аппетита, метеоризм.

Передозировка

Нет данных о передозировке препарата.Лечение при случайном приеме высокой дозы: индукция рвоты, промывание желудка, применение активированного угля, проведение при необходимости симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими препаратами

Силимарин не оказывает существенного влияния на фармакодинамику других лекарственных препаратов.При совместном применении силимарина с пероральными контрацептивами и препаратами, которые используются при гормональной заместительной терапии, возможно уменьшение эффектов последних.Т.к. силимарин обладает ингибирующим действием на систему цитохрома Р450, возможно повышение концентрации в плазме крови таких лекарственных средств, как диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиПрименение препарата в качестве монотерапии не влияет на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей