Инструкция по применению
Карсинитин таблетки 360 мг 70 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: В-МИН
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 70



Описание

Способствует поддержанию функционального состояния печени.В состав БАД «Карсинитин» входит экстракт плодов расторопши пятнистой – травянистое двулетнее растение. В плодах расторопши содержатся 2,8-3,8% флаволигнанов (изомеры силимарина – силибин, силидианин, силикристин и др.), 32% жирного масла, а также биогенные амины (тирамин, гистамин), смолы.На сегодняшний день считаются установленными и достаточно изученными следующие интегральные эффекты силимарина, полученного из расторопши: антиоксидантный: силимарин взаимодействует со свободными радикалами в печени и переводит их в менее токсичные соединения, прерывая процесс перекисного окисления липидов, препятствует разрушению клеточных структур, связываясь со свободными радикалами и регулируя внутриклеточное содержание глутатиона, мембраностабилизирующий: силимарин стабилизирует клеточные мембраны и регулирует их проницаемость, в результате чего предотвращается поступление гепатотоксическнх агентов в гепатоциты, регенерирующий: силимарин стимулирует регенерационные процессы в печени (восстановление поврежденных гепатоцитов) в результате активирования синтеза структурных и функциональных белков и фосфолипидов, противовоспалительный: силимарин угнетает активность липооксигеназы и простагландинсинтазы in vitro. В исследованиях in vitro на человеческих полиморфноядерных лейкоцитах показано, что одним из механизмов реализации противовоспалительного действия является подавление образования перекиси водорода.Эти эффекты удовлетворительно объясняют гепатопротекторное действие силимарина, которое находит широкое применение в клинической практике — препараты из расторопши используют в составе комплексной терапии при токсическом поражении печени, циррозах печени, состояниях после перенесенного острого гепатита, при хроническом гепатите невирусной этиологии, для профилактики печеночных поражений при продолжительном приеме лекарств, алкоголя, при хронической интоксикации (в т.ч. профессиональной).

Состав

МКЦ, лактоза, экстракт сухой семян расторопши пятнистой, сорбит, кальция стеарат или магния стеарат, диоксид кремния.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище —источника флаволигнанов (силимарина). Не является лекарственным средством. В плодах расторопши содержатся 2,8–3,8 % флаволигнанов (изомеры силимарина — силибин, силидианин, силикристин и др.).

Способ применения и дозы

Взрослым по 2 таблетки 1 раз в день, во время приема пищи. Продолжительность приема 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, не рекомендуется употреблять детям до 18 лет.

Особые указания

Содержит лактозу. Содержит подсластитель, при чрезмерном употреблении может оказать слабительное действие. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей при температуре не выше 25°С.