Инструкция по применению
Картилокс Т таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Др.Реддис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 2 года



Состав

L-аргинин альфа-кетоглутарат, хондроитина сульфат натрия, целлюлоза микрокристаллическая (носитель), куркуминоиды (куркуминоиды 95%), целлюлоза микрокристаллическая PH 102 (носитель), поливинилполипирролидон (кросповидон) (стабилизатор), гидролизованный коллаген I типа, витамин С (L-аскорбиновая кислота), бромелаин, астаксантин (получен из микроводоросли Гематококкус плувиалис (Haematococcus pluvialis)), натрия гиалуронат, покрытие таблетки (Flavour (A47R00760) Brown) (гипромеллоза (носитель), пропиленгликоль (носитель), этилцеллюлоза (носитель), тальк (агент антислеживающий), красители: титана диоксид, железа оксид желтый, железа оксид черный, железа оксид красный, ароматизатор лимон (гуммиарабик (эмульгатор), мальтодекстрин, натуральные вкусоароматические субстанции, вкусоароматические препараты), поливинилпирролидон (стабилизатор), магния стеарат (магниевые соли стеариновой кислоты) (агент антислеживающий), тальк (агент антислеживающий), магния оксид (агент антислеживающий), пиперин (экстракт черного перца). Не содержит ГМО.

Форма выпуска

Таблетки

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Взрослым по 2 таблетки 1 раз/сут или по 1 таблетке 2 раза/сут. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Содержание биологически активных веществ в суточной дозе (2 таблетки): Наименование Содержание в суточной дозе (2 таблетки) % от АУП1/% от РУСП2 Астаксантин 2.6 мг 130%1,3 Хондроитина сульфат 293.4 мг 49%1 Куркуминоиды (куркумин) 133.4 мг 267%1,3 Гиалуроновая кислота (натрия гиалуронат) 60.0 мг 120% 1,3 Витамин С 46.6 мг 78 %2 Аргинин 446.0 мг 7%1 Гидролизованный коллаген I типа 80.0 мг Бромелаин (протеолитическая активность) 133.2 GDU Пиперин (экстракт черного перца) 1.66 мг

Противопоказания

* Индивидуальная непереносимость компонентов продукта; * Беременность; * Период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.