Инструкция по применению
Касцебене Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Македония
Производитель: Alkaloid
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Карбоцистеин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 375 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 1, с корпусом и крышечкой темно-желтого цвета. Содержимое капсул - порошок белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Карбоцистеин

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Карбоцистеин быстро всасывается после приема внутрь. Биодоступность низкая (менее чем 10 % от принятой дозы). Максимальная концентрация в сыворотке крови и в слизистой оболочке дыхательных путей достигается через 2-3 часа после приема препарата внутрь и сохраняется в слизистой оболочке в течение 8 часов. Метаболизируется в печени (имеет эффект &laquo

Показания

первого прохождения&raquo

Применение при беременности и кормлении грудью

через печень). Выводится преимущественно почками, частично в неизмененном виде, частично в виде метаболитов. Период полувыведения около 2 часов.

Побочные действия

Для приема внутрь. Взрослые, подростки старше 15 лет: по 750 мг (2 капсулы) три раза в сутки. После достижения терапевтического эффекта суточную дозу снижают до 1,5 г: по 750 мг (2 капсулы) два раза в сутки. Лечение не должно продолжаться более 8-10 дней без консультации с врачом.

Особые указания

Острые и хронические бронхолегочные заболевания, сопровождающиеся образованием вязкой, трудноотделяемой мокроты (трахеит, бронхит, трахеобронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) и слизи (воспалительные заболевания среднего уха, носа и его придаточных пазух - ринит, средний отит, синусит); подготовка к бронхоскопии и/или бронхографии