Инструкция по применению
Кашлестопы Таблетки 3,6г N10

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Зелдис
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 36.0



Описание

Шипучие таблетки Кашлестопы содержат N-ацетил-L-цистеин – производное аминокислоты цистеин Ацетилцистеин способствует разжижению и выведению мокроты из легких.Рекомендованы для профилактики и комплексного лечения ОРЗ, ОРВИ, трахеитов и бронхитов.Являются дополнительным источником витамина С, рутина (витамина Р) и ацетилцистеина.Предназначены для взрослых и детей от 14 лет (БАД).Кашель – это естественная рефлекторная реакция организма на любое раздражение, воспаление дыхательных путей или на что-либо, препятствующее прохождению воздуха. Кашель часто сопутствует инфекции, простуде или бронхиту. Любое народное средство от кашля нужно применять после уточнения причины кашля и консультации врача, который назначит лечение заболевания, ставшего причиной кашля.Сухой кашель обычно болезненный и не приносит облегчения. Он проявляется, когда слизистые оболочки дыхательных путей горячие и сухие.Сухой кашель часто сопровождает ОРВИ, его причинами могут быть ларингит, фарингит.Мокрый кашель проявляется усиленным выделением мокроты. Он становится грубым, с ощущением «хрипоты» в легких. Мокрый кашель может свидетельствовать о серьезных заболеваниях дыхательной системы, таких как бронхиты, трахеиты, воспаление легких.

Состав

Таблетка - 1 табл.:Активные вещества: ацетилцистеин - 200 мг, витамин С - 60 мг, рутин - 30 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Биологически активная добавка к пище – источник глицирризиновой кислоты, дополнительный источник витаминов B1, B3, B5, B6, B7, B12, аскорбиновой кислоты. Обладает противовоспалительным действием, оказывает смягчающее действие при сухом кашле

Способ применения и дозы

Растворить одну таблетку в стакане теплой питьевой воды (200мл).Принимать во время или после еды.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.Содержит подсластитель, при чрезмерном употреблении может вызвать послабляющее действие.

Условия хранения

Хранение в защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C.