
Инструкция по применению
Касторовое Масло для приема внутрь 30 мл (Самарамедпром)

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Касторовое масло
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная, густая и вязкая, от бесцветной до желтого цвета жидкость, запах слабый. На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При охлаждении до - 16 °С застывает в беловатую мазеобразную массу.

Действующее вещество

Касторовое масло

Состав

Действующее вещество: касторовое масло.

Форма выпуска

Масло

Показания

Запор подготовка кишечника перед диагностическими процедурами.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 15-30 г (1-2 столовых ложки) один раз в день. Детям от 12 до 18 лет препарат назначается врачом - по 10-15 г (1 десертная - 1 столовая ложка) один раз в день. Длительность применения - не более 3 дней. Если через 3 дня улучшения не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату "острый" живот беременность детский возраст до 12 лет отравление жирорастворимыми веществами (фосфор бензол и др.) лечение глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения.

Побочные действия

Аллергические реакции. При длительном применении - атония кишечника гипоавитоминозы А и Д. Если у Вас отмечаются побочные эффекты указанные в инструкции или они усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Развивается при приеме масла касторового в дозе более 7 г/кг массы тела. Характерные симптомы: диарея резкие боли спастического характера в животе нарушение функции почек головокружение галлюцинации потеря сознания. Специфическими антидотами являются атропина сульфат и лоперамид. Меры помощи включают отмену лекарственного средства восполнение потерь жидкости и электролитов (предпочтительнее комбинированное пероральное и внутривенное введение) симптоматическую терапию направленную на устранение возникших нарушений. При развитии нейротоксических эффектов вводят диазепам 5-10 мг внутривенно.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении снижает абсорбцию жирорастворимых витаминов A D и K. В дозах до 4 г/сутки увеличивает абсорбцию жирорастворимых лекарств - экстракта мужского папоротника мебендазола гризеофульвина пробукола. Длительное применение касторового масла может привести к развитию гипокалиемии на фоне которой возможно усиление действия сердечных гликозидов и снижение эффективности антиаритмических средств. Совместное применение касторового масла с диуретиками глюкокортикостероидами и препаратами корня солодки может увеличить потерю калия. При одновременном применении с солевыми слабительными возможно резкое усиление слабительного эффекта. М-холиноблокирующие средства (атропина сульфат платифиллин пирензепин) спазмолитические средства (папаверин дротаверин) антигистаминные препараты ослабляют действие касторового масла. Антихолинэстеразные средства (неостигмин пиридостигмин ривастигмин) и глицерин усиливают слабительное действие касторового масла. Касторовое масло усиливает действие средств стимулирующих сократительную активность миометрия (метилэргометрина эргометрина окситоцина простагландинов) вплоть до возникновения угрозы разрыва матки при родах. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением Касторового масла проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Препарат не следует применять более 3-х дней, в случае отсутствия эффекта рекомендуется обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °C. Хранить в недоступном для детей месте.