Инструкция по применению
Касторовое масло Масло для приема внутрь 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Клещевины обыкновенной семян масло
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная, густая и вязкая, от бесцветного до желтого цвета жидкость, запах слабый. На воздухе в тонком слое медленно густеет, но не образует плотной или твердой пленки. При охлаждении до - 16 °С застывает в мазеобразную массу от беловатого до желтого цвета.

Действующее вещество

Клещевины обыкновенной семян масло

Состав

Касторовое масло.

Форма выпуска

Масло

Показания

Запор, подготовка кишечника перед диагностическими процедурами.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 15-30 г (1-2 столовых ложки) один раз в день. Детям от 12 до 18 лет препарат назначается врачом - по 10-15 г (1 десертная - 1 столовая ложка) один раз в день. Длительность применения - не более 3 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, "острый" живот, беременность, детский возраст до 12 лет, отравление жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.), лечение глистной инвазии экстрактом мужского папоротника.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения.

Побочные действия

Аллергические реакции. При длительном применении - атония кишечника, гиповитаминозы A и D.

Передозировка

Развивается при приеме масла касторового в дозе более 7 г/кг массы тела. Характерные симптомы: диарея, резкие боли спастического характера в животе, нарушение функции почек, головокружение, галлюцинации, потеря сознания. Специфическими антидотами являются атропина сульфат и лоперамид. Меры помощи включают отмену лекарственного средства, восполнение потерь жидкости и электролитов (предпочтительнее комбинированное пероральное и внутривенное введение), симптоматическую терапию, направленную на устранение возникших нарушений. При развитии нейротоксических эффектов вводят диазепам 5-10 мг внутривенно.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении снижает абсорбцию жирорастворимых витаминов A, D и K. В дозах до 4 г/сут увеличивает абсорбцию жирорастворимых лекарств - экстракта мужского папоротника, мебендазола, гризеофульвина, пробукола. При одновременном применении с солевыми слабительными возможно резкое усиление слабительного эффекта. М-холиноблокирующие средства (атропина сульфат, платифиллин, пирензепин), спазмолитические средства (папаверин, дротаверин) ослабляют действие касторового масла. Усиливает действие средств, стимулирующих сократительную активность миометрия (метилэргометрина, эргометрина, окситоцина, простагландинов), вплоть до возникновения угрозы разрыва матки в родах.

Особые указания

Препарат не следует применять более 3-х дней, в случае отсутствия эффекта рекомендуется обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25 °C. Хранить в местах, недоступных для детей.