Инструкция по применению
Кедровит Эликсир 250 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МЕЛИГЕН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аронии черноплодной плоды+Березы почки+Боярышника плоды+Боярышника цветки+Сосны кедровой сибирской орех+[Мед]
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Аронии черноплодной плоды+Березы почки+Боярышника плоды+Боярышника цветки+Сосны кедровой сибирской орех+[Мед]

Состав

1 л семена сосны кедровой сибирской 54 г, плоды боярышника 4 г, плоды аронии черноплодной 2 г, почки березы 1.5 г, корневища с корнями элеутерококка 1 г, цветки боярышника обыкновенного 0.5 г. Вспомогательные вещества: мед натуральный - 50 г, сахароза - 22.7 г, этанол 95% - 421 г, вода очищенная - до 1000 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Препарат представляет собой водно-спиртовой экстракт из смеси растительного лекарственного сырья и содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Способ применения и дозы

Внутрь по 2-3 чайные ложки (10-15 мл), разведенные в 100 мл воды. 2 раза в день за 10-15 минут до еды. Курс лечения 5-7 дней. При необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-3 недель после консультации с врачом. Перед употреблением взбалтывать.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к меду и продуктам пчеловодства — острая сердечно-сосудистая и острая почечная недостаточность — тяжелые заболевания печени — алкоголизм — черепно-мозговая травма — заболевания головного мозга — дефицит сахаразы/изомальтазы — непереносимость фруктозы — глюкозо-галактозная мальабсорбция — возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если на фоне приема препарата Ваше состояние ухудшилось, и Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, обратитесь к врачу.

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головная боль, тошнота, рвота. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с никотиновой кислотой, гиполипидемическими средствами (ингибиторами абсорбции холестерина, фибратами) возможно усиление гиполипидемического действия. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В составе препарата содержится сахароза, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Максимальная разовая доза препарата содержит 0.34 г сахарозы (соответствует 0.3 ХЕ (хлебных единиц)), суточная - 0,68 г (соответствует 0.68 ХЕ). Препарат содержит не менее 37% этилового спирта. Максимальная разовая доза препарата содержит 5.9 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата содержит 11,97 г абсолютного этилового спирта. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами Ввиду наличия в составе препарата спирта этилового следует воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Условия хранения

В сухом месте