Инструкция по применению
Кетоконазол ДС Таблетки 200 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ДОМИНАНТА-СЕРВИС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кетоконазол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Действующее вещество

Кетоконазол

Состав

1 таб. кетоконазол 200 мг. Вспомогательные вещества: раствор хлористоводородной кислоты 1М - до pH 2.8-4.0, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для наружного применения: лечение и профилактика грибковых поражений кожи волосистой части головы . дерматомикоз гладкой кожи . паховая эпидермофития . эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи. Для местного применения: лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кандидоза . профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения антибактериальными средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища. Для приема внутрь (при недоступности и непереносимости других методов терапии): бластомикоз, кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз, хромомикоз, паракокцидиоидомикоз.

Противопоказания

Острые и хронические заболевания печени, беременность, лактация, детский возраст до 3 лет, повышенная чувствительность к кетоконазолуодновременный прием со следующими субстратами изофермента CYP3A4 (повышение концентрации этих препаратов в плазме, вызванное совместным приемом с кетоконазолом, может привести к увеличению или продлению как терапевтических, так и побочных эффектов и развитию потенциально опасных эффектов, в т.ч. к удлинению интервала QT и развитию желудочковой аритмии типа "пируэт"): анальгетики (левацетилметадол, метадон)антиаритмики (дизопирамид, дофетилид, дронедарон, хинидин) антигельминтные и антипротозойные препараты (галофантрин)антигистаминные препараты (астемизол, мизоластин, терфенадин)препараты для лечения мигрени (дигидроэрготамин, эргометрин, эрготамин, метилэргометрин)противоопухолевые препараты (иринотекан)антипсихотические препараты, анксиолитики и снотворные препараты (луразидон, мидазолам перорально, пимозид, сертиндол, триазолам) блокаторы кальциевых каналов (бепридил, фелодипин, лерканидипин,нисолдипин) сердечно-сосудистые препараты разных групп (ивабрадин, ранолазин)диуретики (эплеренон)иммунодепрессанты (эверолимус)желудочно-кишечные препараты (цизаприд, домперидон)гиполипидемические препараты (ловастатин, симвастатин) прочие (колхицин при лечении больных с нарушениями функций печени и почек).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии, сонливость, повышенная возбудимость, бессонница, тревога, утомляемость, общая слабость, обратимое повышение внутричерепного давления (например, отек дисков зрительных нервов, набухание родничка у детей младшего возраста). Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в животе, диарея, нарушение функции печени, рвота, диспепсия, запор, сухость во рту, дисгевзия, вздутие живота, изменение цвета языка, токсический гепатит (повышение активности печеночных трансаминаз или ЩФ, желтуха, тяжелая гепатотоксичность, включая холестатический гепатит, гепатонекроз (биопсия), цирроз печени, печеночная недостаточность (включая случаи трансплантации и смерти). Со стороны обмена веществ: непереносимость алкоголя, анорексия, гиперлипидемия, повышение аппетита. Со стороны костно-мышечной системы: миалгия, артралгия. Со стороны дыхательной системы: носовое кровотечение. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: алопеция, дерматит, эритема, многоформная эритема, зуд, сыпь, ксеродерма, приливы крови, острый генерализованный экзантематозный пустулез, фотосенсибилизация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия. Со стороны эндокринной системы: гинекомастия, недостаточность функции надпочечников, нарушение менструального цикла, возможно временное снижение концентрации тестостерона в плазме крови (нормализуется через 24 ч после приема). Со стороны органов чувств: фотофобия. Аллергические реакции: сыпь, крапивница, анафилактический шок, анафилактические реакции, ангионевротический отек. Со стороны иммунной системы: псевдоанафилактический шок. Со стороны половой системы: эректильная дисфункция, азооспермия (при дозах, превышающих терапевтические - 200-400 мг/сут). Со стороны лабораторных показателей: уменьшение числа тромбоцитопения. Общие реакции: лихорадка, периферический отек, озноб.

Особые указания

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, парестезии, сонливость, повышенная возбудимость, бессонница, тревога, утомляемость, общая слабость, обратимое повышение внутричерепного давления (например, отек дисков зрительных нервов, набухание родничка у детей младшего возраста). Со стороны пищеварительной системы: тошнота, боль в животе, диарея, нарушение функции печени, рвота, диспепсия, запор, сухость во рту, дисгевзия, вздутие живота, изменение цвета языка, токсический гепатит (повышение активности печеночных трансаминаз или ЩФ, желтуха, тяжелая гепатотоксичность, включая холестатический гепатит, гепатонекроз (биопсия), цирроз печени, печеночная недостаточность (включая случаи трансплантации и смерти). Со стороны обмена веществ: непереносимость алкоголя, анорексия, гиперлипидемия, повышение аппетита. Со стороны костно-мышечной системы: миалгия, артралгия. Со стороны дыхательной системы: носовое кровотечение. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: алопеция, дерматит, эритема, многоформная эритема, зуд, сыпь, ксеродерма, приливы крови, острый генерализованный экзантематозный пустулез, фотосенсибилизация. Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия. Со стороны эндокринной системы: гинекомастия, недостаточность функции надпочечников, нарушение менструального цикла, возможно временное снижение концентрации тестостерона в плазме крови (нормализуется через 24 ч после приема). Со стороны органов чувств: фотофобия. Аллергические реакции: сыпь, крапивница, анафилактический шок, анафилактические реакции, ангионевротический отек. Со стороны иммунной системы: псевдоанафилактический шок. Со стороны половой системы: эректильная дисфункция, азооспермия (при дозах, превышающих терапевтические - 200-400 мг/сут). Со стороны лабораторных показателей: уменьшение числа тромбоцитопения. Общие реакции: лихорадка, периферический отек, озноб.