Инструкция по применению
Кетонал таблетки покрытые оболочкой 100мг N10

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кетопрофен
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Кетонал - это светло-голубые, круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Действующее вещество

Кетопрофен

Состав

В 1 таблетке, покрытой пленочной оболочкой, содержится:Действующие вещества: Кетопрофен 100 мг.Вспомогательные вещества: стеарат магния, диоксид кремния коллоидный, повидон, крахмал кукурузный, тальк, лактоза.Состав оболочки: Гипромеллоза, макрогол 400, индигокармин Е132, диоксид титана, тальк, воск карнаубский.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Симптоматическая терапия болезненных и воспалительных процессов различного происхождения, в том числе воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата:.

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать во время или сразу после приема пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством воды или молока (объем жидкости - не менее 100 мл).Взрослым и детям старше 15 лет: обычно препарат назначают по 1 таб. 2 раза в день.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Кетонала в III триместре беременности противопоказано. Применение Кетонала в I и II триместрах беременности возможно только в том случае, когда потенциальная польза для матери превышает риск для плода.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, боли в животе, рвота с кровью, мелена, нарушение сознания, угнетение дыхания, судороги, нарушение функции почек, почечная недостаточность.Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, проводят симптоматическую терапию. Воздействие кетопрофена на желудочно-кишечный тракт можно ослабить с помощью антагонистов гистаминовых Н 2-рецепторов, ингибиторов протоновой помпы и простагландинов.

Взаимодействие с другими препаратами

Кетопрофен может ослаблять действие диуретиков, антигипертензивных средств.

Особые указания

Противопоказано при повышенной чувствительности к кетопрофену или другим компонентам препарата, а также салицилатам или другим нестероидным противовоспалительным препаратам. Бронхиальная астма, ринит или крапивница в анамнезе, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения.