Инструкция по применению
Кетотифен Сироп 0,02 % 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: БалканФарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кетотифен
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Кетотифен

Состав

5 мл кетотифена гидрофумарат 1.38 мг, что соответствует содержанию кетотифена 1 мг. Вспомогательные вещества: гипролоза (клуцел LF) 2.4 мг, маннитол (D-маннит) 21 мг, натрия кроскармеллоза (примеллоза) 5.4 мг, целлюлоза микрокристаллическая 48.4 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) 1 мг, магния стеарата моногидрат 1.8 мг. Состав оболочки: опадрай II белый 10 мг (поливиниловый спирт 4 мг, титана диоксид 2.5 мг, макрогол (полиэтиленгликоль) 2.02 мг, тальк 1.48 мг).

Форма выпуска

Сироп

Показания

— атопическая бронхиальная астма (в составе комплексной терапии) . — аллергический ринит, конъюнктивит.

Противопоказания

— беременность, период лактации — детский возраст до 6 месяцев — гиперчувствительность. С осторожностью: эпилепсия, эпизоды судорог в анамнезе, печеночная недостаточность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности. При необходимости применения кетотифена в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Часто: сонливость, головокружение, замедление скорости реакции и чувство усталости (исчезают через несколько дней терапии), седативный эффект, сухость во рту, тошнота, рвота, гастралгия, запор, увеличение массы тела вследствие повышения аппетита. Редко: аллергические реакции . симптомы возбуждения, раздражительность, бессоница, беспокойство и судороги (особенно у детей) . дизурия . тромбоцитопения. Очень редко: цистит, моча темного цвета, гепатит, повышение активности печеночных ферментов, желтуха. В отдельных случаях: многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона.

Особые указания

Часто: сонливость, головокружение, замедление скорости реакции и чувство усталости (исчезают через несколько дней терапии), седативный эффект, сухость во рту, тошнота, рвота, гастралгия, запор, увеличение массы тела вследствие повышения аппетита. Редко: аллергические реакции . симптомы возбуждения, раздражительность, бессоница, беспокойство и судороги (особенно у детей) . дизурия . тромбоцитопения. Очень редко: цистит, моча темного цвета, гепатит, повышение активности печеночных ферментов, желтуха. В отдельных случаях: многоформная эритема, синдром Стивенса-Джонсона.