Инструкция по применению
Хепель Таблетки гомеопатические 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): активные компоненты: Lycopodium clavatum (Lycopodium) (ликоподиум клаватум (ликоподиум)) D3 30 мг, Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D4 30 мг, Cinchona pubescens (China) (цинхона пубесценс (хина)) D3 30 мг, Myristica fragrans (Nux moschata) (миристика фрагранс (нукс мошата)) D4 30 мг, Silybum marianum (Carduus marianus) (силибум марианум (кардуус марианус)) D2 (на 1 таблетку): активные компоненты: Lycopodium clavatum (Lycopodium) (ликоподиум клаватум (ликоподиум)) D3 30 мг, Chelidonium majus (Chelidonium) (хелидониум маюс (хелидониум)) D4 30 мг, Cinchona pubescens (China) (цинхона пубесценс (хина)) D3 30 мг, Myristica fragrans (Nux moschata) (миристика фрагранс (нукс мошата)) D4 30 мг, Silybum marianum (Carduus marianus) (силибум марианум (кардуус марианус)) D2 15 мг, Phosphorus (фосфорус) D6 15 мг, Veratrum album (вератрум альбум) D6 60 мг, Citrullus colocynthis (Colocynthis) (цитрюллюс колоцинтис (колоцинтис)) D6 90 мг, вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактоза до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс терапии 2-3 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная повышенная чувствительность к расторопше пятнистой (Silybum marianum) или иным растениям семейства сложноцветных, а также в случае гиперчувствительности к хинину. Беременность и период грудного вскармливания в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Побочные действия

В редких случаях при приеме препаратов, содержащих хинин или хинидин, могут возникнуть реакции гиперчувствительности (кожная аллергия или лихорадка). В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом. При приеме препаратов, содержащих алкалоиды чистотела, поступали единичные сведения о повышении показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и концентрации билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит). Прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В сухом месте