Инструкция по применению
Хеверт Синуситис Таблетки для рассасывания гомеопатические 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Германия
Производитель: Хеверт Арцнаймиттель
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, белого цвета с гравировкой S3 с обеих сторон.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка содержит: Действующие вещества: Apis mellifica (Пчела медоносная) D4 10 мг Baptisia tinctoria (Баптизия красильная) D4 5 мг Cinnabaris (Hydrargyrum sulfide rubrum) (Ртути сульфид красный) D3 5 мг Echinacea (Эхинацея) D2 30 мг Hepar sulfuris (Печень серная по Ганеману) D3 10 мг Kalium bichromicum (Калия дихромат) D8 30 мг Lachesis mutus (Бушмейстер сурукуку (яд) D8 10 мг Luffa operculata (Люффа слабительная) D4 60 мг Mercurius bijodatus (Ртути дийодид) D9 70 мг Silicea (Кремниевая кислота) D2 5 мг Euspongia officinalis (Губка греческая) D6 10 мг Вспомогательные вещества: магния стеарат 1 мг, крахмал кукурузный 7,5 мг, лактоза моногидрат.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

В составе комплексной терапии длительного насморка с гнойными слизистыми или водянистыми выделениями, затрудненного носового дыхания, заложенности носа, тяжести и боли в области воспаленной пазухи при острых и хронических синуситах.

Способ применения и дозы

Положить таблетку под язык и держать до полного растворения. Детям до 3 лет растворять таблетку в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской. Принимать препарат следует за 20- 30 минут до или после приема пищи. При острой стадии заболевания: взрослым и детям старше 3 лет - по 2 таблетки каждые 30 минут (но не более 12 таблеток в день) до наступления улучшения, затем - по 2 таблетки 4 раза в день (до полного выздоровления). Детям до 3 лет по 1 таблетке 4 раза в день до полного выздоровления. При хроническом течении заболевания рекомендуется проведение более продолжительного курса лечения (по назначению врача). Препарат можно принимать не более 8 недель (без консультации с врачом).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, в том числе к растениям семейства сложноцветных, прогрессирующие системные заболевания: туберкулез, лейкоз, системные заболевания соединительной ткани, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания. Наследственная непереносимость галактозы, генетический дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Усиленное слюноотделение (требует уменьшения дозы или отмены препарата и консультации с врачом), возможны аллергические реакции, в единичных случаях - кожные реакции (требует отмены препарата и консультации с врачом).

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Приём гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Приём гомеопатических лекарств может временно усугубить заболевание (первоначальное ухудшение). В этом случае следует прекратить приём препарата и проконсультироваться с врачом. В случае отсутствия улучшения при остром течении заболевания по истечении 3 дней препарат следует отменить и обратиться к врачу. Информация для больных диабетом: в 1 таблетке препарата содержание углеводов составляет примерно 0,02 хлебной единицы (ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет.

Условия хранения

В сухом месте