Инструкция по применению
Хиалубрикс раствор 1,5% 30 мг/2 мл 3 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Италия
Производитель: Фидия Фармацеутици
Порядок отпуска: по рецепту
Количество в упаковке: 3
Дозировка действующего вещества: 30 мг/2 мл



Описание

Раствор для внутрисуставных инъекций Хиалубрикс - противоревматическое средство, содержащее гиалуроновую кислоту – компонент, имеющийся в высоких концентрациях в составе суставного хряща и синовиальной жидкости. Эндогенная гиалуроновая кислота обеспечивает вязкость и эластичность синовиальной жидкости, также она необходима для формирования протеогликанов в суставном хряще. Хиалубрикс оказывает противовоспалительное действие.

Состав

Гиалуронат натрия, додекагидрат гидрофосфата натрия, дигидрат дигидрофосфата натрия, вода для инъекций.

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

Гиалуроновая кислота эффективно метаболизируется в организме, быстро выводится из кровотока и быстро разрушается в печени. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Около 42% введенной дозы определяют в печени через 24 ч после введения. Препарат определяется в синовиальной жидкости в пределах 2 ч, а в суставном хряще — 6 ч. Хрящ является наиболее постоянным местом локализации гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота содержится в синовиальной жидкости в течение 4–5 суток.

Показания

Травматические и дегенеративные поражения суставов: остеоартроз коленного и бедренного сустава или плечевого сустава с випотом в сустав или без него, а также травматические повреждения суставов с нарушением целостности хряща.

Способ применения и дозы

По назначению врача. Стерильно. Изделие предназначено для однократного использования. Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе аллергии на белок домашней птицы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Несмотря на то что ни эмбриональная токсичность или тератогенный эффект не выявлены при экспериментах, проведенных на животных, применение препарата в период беременности и кормления грудью должно быть ограничено, кроме случаев крайней необходимости, и только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Взаимодействие с другими препаратами

Гиалуроновая кислота взаимодействует с некоторыми местными анестетиками, удлиняя их обезболивающий эффект.

Особые указания

Не рекомендуется применять дезинфицирующие средства, содержащие четвертичные соли аммония, поскольку при контакте с гиалуроновой кислотой возможно образование осадка. Внутрисуставную инъекцию должны проводить компетентные медицинские работники согласно установленной процедуре и в асептических условиях, необходимых для этого способа применения. Особая осторожность необходима при наличии у пациента симптомов инфекции в месте инъекции, чтобы предотвратить возможное возникновение бактериального артрита. Перед проведением внутрисуставной инъекции пациента необходимо обследовать для выявления признаков острого воспаления. При наличии таких признаков врач должен оценить целесообразность проведения инъекции. При наличии суставного выпота перед введением рекомендуется провести аспирацию. Рекомендуется не перенагружать сустав на протяжении нескольких часов после инъекции.