Инструкция по применению
Хилак форте Капли для приема внутрь 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Меркле ГмбХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лактобактерии ацидофильные
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Лактобактерии ацидофильные

Состав

100 мл препарата (без вкуса/со вкусом вишни) содержат: Действующие вещества: водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli DSM 4087* - 24.9481 г, водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecalis DSM 4086* - 12.4741 г, водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus DSM 4149* - 12.4741 г, водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus DSM 4183* - 49.896 ,г. * - субстраты содержат лактозу вспомогательные вещества: динатрия фосфат гептагидрат - 1.159 ,г, дикалия фосфат - 1.265 ,г, молочная кислота - 2.5-6.25 г, фосфорная кислота концентрированная - 0.352 ,г, калия сорбат - 0.1135 г, лимонной кислоты моногидрат - 0.0322 г, натрия сахаринат - 0.02 г, натрия цикламат - ,0.2 г, ароматизатор кремовый - ,0.2 г, ароматизатор вишневый - 0.5 г, вода до 100 мл.

Форма выпуска

Капли

Показания

нарушение физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами лучевой терапии), синдром недостаточности пищеварения, диспепсии, диарея, метеоризм, запоры, гастроэнтерит, колит, синдром старческого кишечника (хронические атрофические гастроэнтериты), расстройства со стороны желудочнокишечного тракта, вызванные сменой климата, гипо- и анацидные состояния, энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени, аллергические кожные заболевания (крапивница эндогенно обусловленная хроническая экзема), сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в том числе детей грудного возраста).

Способ применения и дозы

Хилак форте принимают внутрь до или во время приема пищи разбавляя небольшим количеством жидкости исключая молоко. Препарат назначают 3 раза в сутки: взрослым: по 40-60 капель или 2 2-3 3 мл на прием, детям: по 20-40 капель или 1 1-2 2 мл на прием, младенцам: по 15-30 капель на прием. Младенцам рекомендуется использовать препарат во флаконах. После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы/изомальтазы, непереносимость лактозы, глюкозогалактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Хилак форте в период беременности и лактации считается безопасным. Однако решение о назначении препарата принимает лечащий врач.

Побочные действия

Хилак форте хорошо переносится больными любого возраста. Побочные действия до настоящего времени не наблюдались. Возможны аллергические реакции (кожная сыпь зуд крапивница), запор, диарея.

Передозировка

Никаких специальных мероприятий за исключением обычного медицинского наблюдения не требуется.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием данного препарата с молоком и молочными продуктами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 &deg,C. Хранить в недоступном для детей месте!