# Инструкция по применению
# Хлорофиллипт Раствор спиртовой 1 % 50 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Кировская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 2.0

## Описание

Жидкость темно-зеленого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка, образующего налет на стенках и на дне флакона.

## Действующее вещество

Эвкалипта листьев экстракт

## Состав

Активный компонент: хлорофиллипт экстракт густой, - 10 мг в пересчете на сухое вещество. Вспомогательное вещество: спирт этиловый (этанол) 96 % - до 1 мл.

## Форма выпуска

Раствор

## Показания

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами, ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей, эрозия шейки матки, для профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

**Способ применения и дозы**

Взрослым препарат назначают внутрь, местно, наружно. Детям до 18 лет препарат назначают местно и наружно. Внутрь. При применении у взрослых при кишечном носительстве стафилококков по 5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды, 3 раза в день за 40 минут перед едой ежедневно в течение 2-3 недель. Местно. При кишечном носительстве стафилококков препарат Хлорофиллипт назначают также ректально в клизме (по 20 мл 1 % спиртового раствора разводят в 1 л воды - это доза для одной клизмы). Клизму с препаратом ставят через каждые два дня. Детям в объеме (в мл), соответствующем возрасту. Курс лечения состоит из 10 процедур. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки и эрозию 1 % спиртовым раствором препарата Хлорофиллипт, разведенным 1: 10. Манипуляцию проводят в течении 10 дней ежедневно, после чего пациентка должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка 1 % спиртового раствора на 1 л воды). Курс лечения - 2 недели. При неполной эпителизации курс лечения повторяют. Наружно, при лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв, 1 % спиртовой раствор Хлорофиллипта разводят 0,25 % раствором новокаина в соотношении 1:5 и используют в виде пропитанных этим раствором марлевых повязок. Курс лечения составляет 2-3 недели. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к экстракту листьев эвкалипта или любому из вспомогательных веществ. При приеме внутрь - возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания, заболевания печени, черепно-мозговая травма, алкоголизм, заболевания головного мозга.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

При беременности и в период грудного вскармливания применение внутрь противопоказано. Возможно наружное и местное применение, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочные действия**

Аллергические реакции (отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода, препарат Хлорофиллипт выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее следует удалить стерильным изотоническим раствором натрия хлорида.

**Особые указания**

При применении внутрь содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 3,8 мг, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата 11,4 мг. При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей, эрозии шейки матки) процедуры можно чередовать с применением 2 % масляного раствора хлорофиллипта.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25# С Хранить в недоступном для детей месте!