Инструкция по применению
Хлорофиллип таблетки для рассасывания

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Украина
Производитель: Опытный завод ГНЦЛС
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской, от светло-зеленого до зеленого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, с характерным запахом.

Состав

На одну таблетку: Активный компонент: Хлорофиллипт (Эвкалипта листьев экстракт) экстракт густой в пересчете на сухое вещество с антибактериальной активностью в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды 0,025 г Вспомогательные вещества: Сахар (сахароза) 0,617 г Целлюлоза микрокристаллическая 0,120 г Лимонной кислоты моногидрат 0,030 г Кальция стеарат 0,008 г

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

В комплексной терапии заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит фарингит ларингит).

Способ применения и дозы

Местно. По 1 таблетке 5 раз в день через 30-40 мин после еды. Максимальная суточная доза - 5 таблеток. Таблетки следует рассасывать во рту до полного растворения не разжевывая. Длительность лечения 7 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата врожденная непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция дефицит сахаразы /изомальтазы возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции местнораздражающее действие на слизистую оболочку полости рта. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки хлорофиллипта при местном применении до настоящего времени не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Перед началом лечения необходимо сделать тест на чувствительность пациента к лекарственному препарату. При отсутствии через 6-8 часов аллергических реакций после приема одной таблетки можно начинать курсовое лечение. Для избежания местнораздражающего действия препарата на слизистую оболочку полости рта не следует держать таблетку под языком или за щекой а рекомендуется активно рассасывать ее в полости рта (не более 30 минут). Больным сахарным диабетом необходимо учитывать что в одной таблетке содержится 0617 г углеводов (0051 ХЕ). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.