Инструкция по применению
Хлорофиллонг Раствор спиртовой 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Описание

Прозрачная жидкость от зеленого до темно-зеленого цвета с характерным запахом. Возможно помутнение жидкости и выпадение осадка в процессе хранения.

Действующее вещество

Эвкалипта листьев экстракт

Состав

Эвкалипта прутовидного листьев - 200 г, меди двухлористой 2-водной (меди хлорида дигидрата) - 0,06 г, спирта этилового 95 % (этанола) до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Местно: в комплексном лечении ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки.
Внутрь и местно: для санации кишечника при стафилококконосительстве.

Способ применения и дозы

Для местного применения: при лечении ожогов и трофических язв препарат разводят в соотношении 1:5 в 0,25 % растворе новокаина. Используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения - 2-3 недели. При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки. Смазывают канал шейки матки и эрозии неразведенным препаратом. Курс лечения - 10 дней. Для спринцевания влагалища используют раствор, получаемый разведением 15 мл (1 столовой ложки) препарата в 1 л воды. Курс лечения - 2 недели. При стафилококковом поражении кишечника принимают внутрь по 5 мл препарата, разведенного в 30 мл воды, 3 раза в день за 40 мин перед едой ежедневно. Препарат применяют также местно ректально в клизме (по 20 мл препарата в 1 л воды - доза для одной клизмы) 1 раз в 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур. Перед применением препарат необходимо взбалтывать.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. При применении внутрь: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции: отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

При взаимодействии препарата с перекисью водорода выпадает осадок. Поэтому после обработки раны раствором перекиси водорода перед использованием препарата Хлорофиллонг, рану следует промыть стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида.

Особые указания

До лечения необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к препарату. Для этого пациенту дают выпить 25 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч аллергических реакций (отечности губ, слизистых оболочек, кожных высыпаний) можно назначить курсовое лечение препаратом, при наличии аллергических реакций препарат противопоказан. Содержание абсолютного этилового спирта при приеме препарата внутрь составляет в максимальной разовой дозе - 5,19 г, в максимальной суточной дозе - 15,57 г. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:При применении препарата внутрь необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, так как препарат содержит этиловый спирт.

Условия хранения

Беречь от детей