Инструкция по применению
Хлорофиллонг Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой 50 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Эвкалипта прутовидного листьев настойка
Количество в упаковке: 1



Описание

Местное применение Хлорофиллонга: в комплексном лечении ожогов и трофических язв, эрозии шейки матки.

Действующее вещество

Эвкалипта прутовидного листьев настойка

Состав

На 100 мл раствора листьев эвкалипта прутовидного 20 г, хлорида меди дигидрата 6 мг. спирта этилового 95% - до получения 100 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

ожоги.трофические язвы.эрозии шейки матки.кишечное носительство стафилококков.

Способ применения и дозы

Местно, при лечении ожогов и трофических язв — 1% спиртовой раствор разводят в отношении 1:5 в 0,25% растворе прокаина (новокаина). 1% спиртовой раствор (15 мл разводят в 1 л воды) — для спринцевания влагалища.Внутрь, при кишечном носительстве стафилококков — по 5 мл 1% спиртового раствора, разведенных в 30 мл воды, ежедневно 3 раза в день за 40 мин до еды.Клизмы — 20 мл 1% спиртового раствора в 1 л воды.Перед применением флакон необходимо взбалтывать.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Побочные действия

Аллергические реакции на компоненты Хлорофиллонга: отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания.При любых замеченных побочнных эффектах, в том числе не отмеченных в инструкции, необходимо немедленно сообщить врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении Хлорофиллонга активные компоненты данного препарата взаимодействуют с перекисью водорода - выпадает осадок: в связи с этим после обработки раны раствором перекиси водорода перед использованием Хлорофиллонга рану необходимо промыть стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида.

Особые указания

При применении Хлорофиллонга внутрь необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, поскольку препарат содержит этиловый спирт: содержание спирта при приеме внутрь в максимальной разовой дозе - 5,19 г, в максимальной суточной - 15,57 г.До начала лечения Хлорофиллонгом необходимо проверить индивидуальную чувствительность пациента к препарату: выпить 25 капель препарата, разведенных в 1 столовой ложке воды. При отсутствии аллергических реакций через 6-8 ч (отечности губ, слизистых оболочек, кожных высыпаний) можно назначить курсовое лечение Хлорофиллонгом. Если обнаружено проявление аллергических реакций - препарат противопоказан.

Условия хранения

При комнатной температуре. Беречь от детей