Инструкция по применению
Хмель шишки 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Травяной сбор
Страна: Россия
Производитель: ЛЕКРА-СЭТ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Препараты хмеля обыкновенного проявляют успокаивающие, диуретические, капилляроукрепляющие, противовоспалительные, противоязвенные, бактерицидные, болеутоляющие, антиаллергические свойства. Установлено действие на регуляцию жирового, минерального и водного обмена. Они также повышают аппетит и улучшают пищеварение. Хмель обыкновенный в сочетании с другими лекарственными растениями будет эффективным при лечении цистита и пиелонефрита. Препараты хмеля рекомендованы для лечения, бессонницы, вегетососудистой дистонии, также при гипоменструальном синдроме (на почве эстрогенной недостаточности яичников), аменореи, при нервном истощении, как средство, укрепляющее сердечнососудистую систему. Ещё, настой шишек хмеля употребляют при чрезмерном половом возбуждении и для прекращения лактации. Наружно настой шишек хмеля, мазь применяют для лечения ушибов, экземы, язв, также при облысении, при подагрических и ревматических болях.

Состав

Измельченные соплодия (шишки) хмеля обыкновенного.

Форма выпуска

Травяной сбор

Показания

При нарушении обмена веществ, расстройствах кишечника, как общеукрепляющее средство, при параличе, подагре, ревматизме, нефритах (в виде ванн), при нервном переутомлении, легких депрессиях, неврозах, неврастении, головной боли, головокружении, бессоннице, гастритах, болезненных раздражениях мочевого пузыря, при циститах, уретритах, заболеваниях почек, почечных лоханок, печени и желчного пузыря, а также как средство, укрепляющее сердечно-сосудистую систему (особенно при слабости миокарда). Наружно настой шишек хмеля, мазь применяют для лечения ушибов, экземы, язв, также при облысении, при подагрических и ревматических болях.

Способ применения и дозы

Залить 1/4 стакана растертых шишек хмеля 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав. 20 минут, процедить. Пить по 0,3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Передозировка

Тошнота, рвота, боли в области живота, головная боль, чувство усталости.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Беречь от детей