Инструкция по применению
Эвалар Хофицин Таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Артишока листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Действующее вещество

Артишока листьев экстракт

Состав

Состав (на одну таблетку): Активный компонент: артишока посевного листьев экстракт сухой*, с содержанием хлорогеновой кислоты в пересчете на сухое вещество не менее 0,5 % – 200,00 мг, Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, повидон К17, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. Вспомогательные вещества оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза), полиэтиленгликоль 4000, краситель железа оксид красный, титана диоксид, краситель железа оксид черный. * Артишока посевного листьев экстракт сухой получают из артишока листьев свежих – Cynara scolymus L., сем. сложноцветных – Asteraceae, соотношение используемого сырья к полученному экстракту (1535:1), экстрагент вода очищенная.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии: дискинезии желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов: хронических гепатитов, цирроза печени, хронического нефрита, хронической почечной недостаточности.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 6 лет рекомендуется принимать по 1 2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды. Курс лечения – 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непроходимость (обтурация) желчевыводящих путей, острые заболевания печени, почек, желче и мочевыводящих путей, тяжелая гепатоцеллюлярная недостаточность. Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению и под контролем врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестны.

Особые указания

В случае развития тяжелой длительной диареи или абдоминальной боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке). Хранить в недоступном для детей месте.