Инструкция по применению
Хофитол таблетки покрытые оболочкой 180 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: МАЙОЛИ СПИНДЛЕР ЛАБ.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Артишока листьев экстракт
Количество в упаковке: 180
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Артишока листьев экстракт

Состав

Действующее вещество: Артишока листьев экстракт (Cynarae scomuli foliae extract)
Концентрация действующего вещества (мг): 200

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Действие препарата Хофитол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

В составе комплексной терапии:— дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу;— хронический некалькулезный холецистит;— хронический гепатит;— цирроз печени;— хронический нефрит;— хроническая почечная недостаточность.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают по 2-3 таб. или по 2.5-5 мл раствора для приема внутрь 3 раза /сут до еды. Курс лечения - 2-3 недели.Детям старше 6 лет назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут до еды. Раствор для приема внутрь, в зависимости от возраста, назначают в дозе, составляющей от 1/4 до 1/2 дозы, применяемой у взрослых. Курс лечения - 2-3 недели.Необходимость повторных курсов терапии врач определяет индивидуально.

Противопоказания

желчнокаменная болезнь;непроходимость желчных путей;острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей; детский возраст до 6 лет (для таблеток);повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Хофитола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только под контролем врача.

Побочные действия

возможно развитие диареи при длительном приеме препарата в высоких дозах, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление проявлений побочного действия.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Хофитол не описано.

Особые указания

1 чайная ложка раствора содержит 0.13 г этилового спирта.

Условия хранения

Беречь от детей