Инструкция по применению
Хофитол Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Франция
Производитель: Майоли Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Артишока листьев экстракт
Количество в упаковке: 30



Описание

Круглые таблетки двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой коричневого цвета.

Действующее вещество

Артишока листьев экстракт

Состав

Препарат Хофитол содержит: Действующим веществом является: артишока листьев экстракт. Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит 200 мг (0,2 г) артишока (Cynara Scolymus L.) листьев экстракта сухого (водного). Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: магния трисиликат, крахмал кукурузный, тальк, магния стеарат, гуммилак, канифоль, желатин, сахароза, карбонат кальция, краситель дисперсный1, карнаубский воск, полисорбат 80. 1 Краситель дисперсный состоит из сахарозы, воды очищенной*, оксида железа желтого, черного и красного (Е 172), этанола безводного*. * - Удаляется в процессе производства.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат Хофитол применяется у взрослых и детей от 6 до 18 лет в комплексной терапии дискинезий желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, циррозов печени хронических нефритов, хронической почечной недостаточности.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза для взрослых По 2-3 таблетки 3 раза в день. Применение у детей и подростков Детям от 6 до 18 лет по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день. Безопасность и эффективность применения препарата Хофитол у детей в возрасте до 6 лет не установлены. Данные отсутствуют. Путь и/или способ введения Внутрь. Принимайте препарат до еды. Продолжительность терапии Курс лечения - 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом. Если Вы забыли принять препарат Хофитол Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Хофитол: Если Вы считаете, что любое из перечисленного относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Применение препарата Хофитол при беременности возможно только по назначению и под контролем врача. Грудное вскармливание Применение препарата Хофитол в период грудного вскармливания возможно только по назначению и под контролем врача.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Если Вы заметили любую из перечисленных ниже нежелательных реакций - прекратите прием препарата Хофитол и немедленно обратитесь к врачу, Вам может потребоваться медицинская помощь: Частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных):

Передозировка

Если Вы приняли препарата Хофитол больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Хофитол больше, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Возьмите с собой упаковку препарата и/или данный листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Значимых лекарственных взаимодействий не выявлено.

Особые указания

Перед приемом препарата Хофитол проконсультируйтесь с лечащим врачом. В случае развития тяжелой длительной диареи или абдоминальной боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу. При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 2-х недель необходимо проконсультироваться с врачом. Препарат содержит сахарозу. Суточная доза препарата содержит 0,040 хлебных единиц (ХЕ). Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью сахаразы/изомальтазы, непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот препарат. Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет вследствие риска неэффективности и вероятной небезопасности (безопасность и эффективность применения препарата Хофитол у детей в возрасте до 6 лет не установлены). Препарат Хофитол содержит сахарозу Препарат Хофитол содержит сахарозу, если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.