Инструкция по применению
Хофитол Таблетки покрытые оболочкой 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Франция
Производитель: МАЙОЛИ СПИНДЛЕР ЛАБ.
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Артишока листьев экстракт
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Артишока листьев экстракт

Состав

Состав (на 1 таблетку) Ядро таблетки: Активный компонент: Артишока полевого (Cynara scolymus L.) листьев экстракт сухой (водный) 200 мг (0,20 г) Вспомогательные вещества: Магния трисиликат 12,00 мг; Крахмал кукурузный 22,00 мг; Тальк 3,00 мг; Магния стеарат 3,00 мг. Оболочка таблетки: Гуммилак 1,1520 мг; Канифоль 1,1520 мг; Тальк 16,300 мг; Желатин 0,384 мг; Сахароза 86,146 мг; Карбонат кальция 2,2 мг; Краситель дисперсный* 2,580 мг; Карнаубский воск 0,082 мг; Полисорбат 80 0,004 мг. *Состав красителя дисперсного: сахароза, оксиды железа желтого, черного и коричневого (Е 172), метилпарагидроксибензоат (Е 218) и этилпарагидроксибензоат (Е 214).

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Действие препарата Хофитол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата

Показания

Препарат применяется в комплексной терапии дискинезии желчевыводящих путей цо гипокинетическому типу, хронических некалькулезных холециститов, хронических гепатитов, цирроза печени, хронического нефрита, хронической почечной недостаточности

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым по 2-3 таблетки 3 раза в день до еды. Детям старше 6-ти лет рекомендуется принимать по 1-2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза в день до еды. Курс лечения 2-3 недели. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, желчнокаменная болезнь, непроходимость желчных путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение Хофитола в период беременности и кормления грудью возможно только по назначению врача

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи

Передозировка

Симптомы: возможно усиление проявлений побочного действия

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Хофитол не описано

Особые указания

В случае развития тяжелой длительной диареи или абдоминальной боли прием препарата должен быть прекращен и следует обратиться к врачу. Препарат содержит парагидроксибензоат и может вызвать аллергические реакции (возможны отсроченные реакции). Данный препарат содержит сахарозу. Суточная доза препарата содержит 0,040 хлебных единиц (ХЕ). Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении