Инструкция по применению
Холензим Таблетки покрытые оболочкой 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Беларусь
Производитель: Биотэк
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Желчь+Поджелудочной железы порошок+Слизистой тонкой кишки порошок
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 100 мг+100 мг+100 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Желчь+Поджелудочной железы порошок+Слизистой тонкой кишки порошок

Состав

Действующее вещество: желчи сухой 100 мг, поджелудочной железы высушенной (получают из поджелудочной железы замороженной) 100 мг, слизистых оболочек тонких кишок высушенных 100 мг. Вспомогательные вещества: сахароза, магния гидроксикарбонат, мука пшеничная, кремния диоксид коллоидный, титана диоксид, кальция стеарат, желатин, воск пчелиный. Концентрация действующего вещества (мг): 300 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве желчегонного и пищеварительного ферментного средства при заболеваниях и функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта: хронический гепатит, хронический холецистит, хронический панкреатит, гастрит, колит, метеоризм, диарея неинфекционного генеза. Для улучшения переваривания пищи у лиц с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае погрешностей в питании (употребление жирной пищи, большого количества пищи, нерегулярное питание) и при нарушениях жевательной функции, малоподвижном образе жизни, длительной иммобилизации.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 1-3 раза в сутки. Принимать таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости. Не рекомендуется превышать суточную дозу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, обтурационная желтуха, детский возраст до 12 лет.

Побочные действия

Аллергические реакции (чихание, слезотечение, покраснение кожи, кожная сыпь). При их появлении необходимо прекратить употребление препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

При длительном применении высоких доз возможны тошнота, изжога, диарея, кожный зуд, повышение уровня трансаминаз в крови.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и /или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности препарата. При длительном применении возможно снижение всасывания железа.

Особые указания

Принимать таблетки не разжевывая, с большим количеством жидкости. Не рекомендуется превышать суточную дозу.

Условия хранения

В сухом месте