Инструкция по применению
Холикрон Таблетки 200 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гимекромон
Количество в упаковке: 50



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки от белого до белого с желтоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Гимекромон

Состав

1 таблетка содержит: Действующее вещество: гимекромон - 200,00 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 45,00 мг, желатин - 3,00 мг, натрия лаурилсульфат - 1,00 мг, магния стеарат - 1,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция При приеме внутрь легко всасывается из пищеварительного тракта. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 2-3 часа. Распределение Слабо связывается с белками плазмы. Элиминация Период полувыведения составляет около 1 часа. Гимекромон выводиться почками (около 93 % в виде глюкуроната, 1,4 % - сульфоната, 0,3 % - в неизмененном виде).

Показания

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу, некалькулезный хронический холецистит, холангит, желчекаменная болезнь, состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях. Снижение аппетита, тошноты, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи).

Способ применения и дозы

Внутрь, за 30 минут до еды. Взрослым - по 200-400 мг (1-2 таблетки) 3 раза в день. Суточная доза 1200 мг. Детям с 7 лет по 200 мг (1 таблетка) 1-3 раза в день. Суточная доза 600 мг. Курс лечения 2-3 недели. В случае пропуска приема дозы следует принять препарат как можно быстрее или, если приближается время следующего приема, пропущенную дозу не принимать. Не следует принимать двойную дозу сразу. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к гимекромону или любому другому компоненту, входящему в состав, непроходимость желчевыводящих путей, почечная/печеночная недостаточность, язвенный колит и болезнь Крона, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гемофилия, детский возраст до 7 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Нет данных о безопасности применения гимекромона при беременности. Назначение препарата Холикрон беременным женщинам допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Период грудного вскармливания Нет данных о безопасности применения гимекромона в период грудного вскармливания. Назначение препарата Холикрон в период грудного вскармливания допустимо только в тех случаях, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

Частота побочных реакций приведена в виде следующей градации: очень часто (⩾ 1 /10), часто (⩾ 1/100, но нечасто (⩾ 1/1000, но редко (⩾ 1/10000, но очень редко (частота неизвестна (не может быть оценена на основе имеющихся данных). Нарушения со стороны иммунной системы Частота неизвестна: аллергические реакции. Нарушения со стороны нервной системы Частота неизвестна: головная боль. Желудочно-кишечные нарушения Частота неизвестна: диарея, метеоризм, абдоминальная боль, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Морфин ослабляет действие гимекромона. При совместном приеме с метоклопрамидом происходит ослабление действия обоих препаратов. Усиливает эффекты непрямых коагулянтов. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Холикрон проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не ухудшает секреторную функцию пищеварительных желез и процессов кишечной абсорбции. В случае появления симптомов печеночной и/или почечной недостаточности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке). Хранить в недоступном для детей месте.