Инструкция по применению
Хондрамин таблетки 10 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КЛИНИКА ИНСТИТ.БИОРЕГУЛЯЦ. И ГЕРОНТОЛОГИИ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Хондрамин получен из хрящей крупного рогатого скота и представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, обладающих избирательным действием на клетки хрящевой ткани, он способствует регулированию обменных процессов в хрящах и снижает возможность возникновения различных поражений суставов и позвоночника.Клинические испытания проведены у 112 больных с остеоартрозом коленных суставов, остеохондрозом позвоночника, остеопорозом. Контрольная группа состояла из 96 больных с аналогичными заболеваниями, которым назначалось традици-онное лечение.Оценивали динамику жалоб больных, их клиническое состояние, функциональные возможности опорно-двигательного аппарата, а также общеклиническое исследование крови и мочи, биохимическую картину крови, сравнительные данные рентгенографии.Применение хондрамина на фоне традиционной терапии способствовало снижению болевого синдрома и тугоподвижности суставов у больных. Степень клинического эффекта зависела от стадии протекания заболевания: у лиц пожилого возраста динамика была менее выражена, однако такие субъективные ощущения оценивались как очень благоприятные для старшей возрастной категории больных. Наиболее характерным являлось снижение болевого синдрома и увеличение объема движения в больных суставах. Отмечалось существенное сглаживание основных симптомов течения заболеваний, характеризующихся значительной консервативностью.

Состав

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой от светло-кремового до кремового цвета, круглой формы, диаметром 7 мм, массой 0.155 мг, возможно наличие специфического запаха.1 таб.хондрамин порошок* - 10 мг* комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из хрящей крупного рогатого скота и свиней.Вспомогательные вещества: лактоза (наполнитель), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечнорастворимое покрытие), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника полипептидов и нуклеиновых кислот при: дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов конечностей и позвоночника, последствиях травм суставов и конечностей, артропатиях различной этиологии, системных заболеваниях соединительной ткани, состояниях после экстремальных физических нагрузок, в пред- и послеоперационном периоде при операциях на суставах, для системной профилактики костно-суставных нарушений в спорте высших достижений.

Способ применения и дозы

Принимают за 10-15 минут до еды по 1 - 3 таб- летки 2 - 3 раза в день в течение 30-45 дней. Запивать водой, не разжевывать!Желателен повторный курс через 3-6 месяцев

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Особые указания

Не является лекарственным средством.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.