**Инструкция по применению**
**Хондроксид форте крем 30г**

### Характеристики




Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мелоксикам+Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

### Действующее вещество

Мелоксикам+Хондроитина сульфат

### Состав

Действующее вещество: Мелоксикам + Хондроитина сульфат* (Meloxicamum + Chondroitini sulfas)Концентрация действующего вещества (мг ): Хондроитина сульфат натрия (в пересчете на 100% сухое вещество) 50 мг

### Форма выпуска

Крем

### Фармакокинетика

Хондроксид гель хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием меченого радиоактивностью 3H- хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14%. Диметилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения препарата Хондроксид гель на кожу быстро и избирательно поступает в сустав с достижением Cmax через 30 мин и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 ч после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 ч.

**Показания**

Препарат рекомендуется к применению в составе комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеоартроза, остеохондроза позвоночника; иных заболеваний суставов, сопровождающихся болевым синдромом.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Слегка втирают полоску крема длиной от 1 до 5 см, кратность применения — 2-3 раза в сутки. Необходимое количество препарата зависит от размера болезненной зоны. После нанесения препарата руки необходимо тщательно вымыть. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта. После 2-х недель использования препарата следует проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата (а также к другим нестероидным противовоспалительным средствам), нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

С осторожностью и после консультации врача следует применять Хондроксид в лекарственной форме гель и мазь при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции со стороны кожи (зуд, покраснение, кожная сыпь). При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение крема и обратиться к врачу.

**Передозировка**

В настоящее время о случаях передозировки препарата Хондроксид не сообщалось.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Лекарственное взаимодействие препарата Хондроксид не описано.

**Особые указания**

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и открытые раны.При попадании на кожу или одежду гель легко смывается водой, не оставляя следов.

**Условия хранения**

Беречь от детей