Инструкция по применению
Хондроксид Гель для наружного применения 5 % 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24.0

Описание

Бесцветный или с желтоватым оттенком прозрачный гель с фруктовым запахом

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

1 г геля содержит: действующее вещество: хондроитина сульфат натрия — 50,0 мг, вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, гиэтеллоза (гидроксиэтилцеллюлоза, Natrosol 250), натрия дисульфит, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор апельсиновый, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Хондроксид® гель хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3H-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14 %. Димегилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения препарата Хондроксид® гель на кожу быстро и избирательно поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 минут и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания

Дегенеративно-дистрофические заболевания периферических суставов и позвоночника: лечение и профилактика остеоартроза, остеохондроза позвоночника.

Способ применения и дозы

Наружно. Хондроксид® гель наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и легко втирают похлопывающими движениями в течение 2-3 мин до полного впитывания. Курс лечения — от 2-3 недель до 2-3 месяцев. При необходимости курс лечения повторяют.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Повреждение кожных покровов в области нанесения препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяется только после консультации врача и с осторожностью, длительность лечения определяет врач.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Хондроксид® гель не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не известны.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки и открытые раны. При попадании на кожу или одежду гель легко смывается водой, не оставляя следов.
Не применять препарат без консультации врача в детском возрасте.

Условия хранения

Беречь от детей