
Инструкция по применению
Хондроксид Мазь для наружного применения 5 % 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Хондроитина сульфат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%

Описание

Мазь светло-желтого цвета с характерным запахом

Действующее вещество

Хондроитина сульфат

Состав

100 г мази содержат: хондроитина сульфат (в пересчете на сухое вещество) – 5 г (вытяжка из хрящевой ткани), диметилсульфоксид (димексид) – 10 г, ланолин безводный - 15 г, вазелин - 50 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Хондроксид® мазь хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3H-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14 %. Диметилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат после нанесения препарата Хондроксид® мазь на кожу быстро и избирательно поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 минут и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания

Дегенеративно-дистрофические заболевания периферических суставов и позвоночника: лечение и профилактика остеоартроза, остеохондроза позвоночника.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь Хондроксид® наносят 2-3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2-3 мин до полного впитывания. Курс лечения — от 2-3 недель до 2-3 месяцев. При необходимости — курс лечения повторяют.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Повреждение кожных покровов в области нанесения препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата Хондроксид® мазь не сообщалось.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата Хондроксид® на слизистые оболочки.
Не применять препарат без консультации врача при беременности, в период лактации, в детском возрасте.

Условия хранения

В сухом месте