Инструкция по применению
Киндинорм гранулы 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Гранулы
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48.0

Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Chamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D12 166.7 мгValeriana officinalis (Valeriana) (валериана оффициналис (валериана)) D6 166.7 мгCuprum metallicum (Cuprum) (купрум металликум (купрум)) D10 166.7 мгKalium phosphoricum (калиум фосфорикум) D6 166.7 мгDelphinium staphisagria (Staphisagria) (дельфиниум стафизагрия (стафизагрия)) D12 166.7 мгCalcium hypophosphorosum (кальциум гипофосфорозум) D4 166.7 мгВспомогательные вещества: сахароза - 100 г.

Форма выпуска

Гранулы

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Киндинорм не предоставлены.

Показания

У детей в возрасте от 1 года до 7 лет при повышенной возбудимости, неусидчивости, расстройствах сна (в составе комплексной терапии), у детей в возрасте от 7 лет и у взрослых при нарушениях концентрации внимания, повышенной возбудимости, неусидчивости, расстройствах сна (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Гранулы предпочтительно принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Детям в возрасте до 3 лет для удобства применения гранулы можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).Если не назначено иначе, Киндинорм рекомендуется принимать следующим образом: взрослым - по 20 гранул 3 раза/сут, детям и подросткам в возрасте от 10 до 18 лет - по 10 гранул 3 раза/сут, детям в возрасте от 1 года до 10 лет - по 1 грануле на каждый год жизни 3 раза/сут.Курс лечения составляет не менее 6 недель. Продолжительность лечения определяется врачом.

Противопоказания

Не применять препарат у детей в возрасте больше 1 года ввиду отсутствияклинических исследований. В соответствии с общепринятымипринципами применять препарат в период беременности и кормления грудьюможно только после оценки соотношения ожидаемой пользы для материи возможного риска для плода /ребенка.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

На настоящий момент взаимодействие препарата Киндинорм с другими лекарственными средствами не выявлено.Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При отсутствии улучшения после 4 недель лечения препаратом или при ухудшении состояния следует проконсультироваться с врачом для коррекции лечения.Длительное лечение от 6 недель и более 8 недель рекомендуется проводить только после консультации с врачом и под его наблюдением.При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно возникновение временного первичного ухудшения состояния. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что максимальная суточная доза 60 гранул содержит 1.2 г сахарозы, что соответствует 0.1 хлебной единицы (ХЕ).Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмамиВ период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении