Инструкция по применению
Препарат комплексный иммуноглобулиновый КИП Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь 300 мг/доза 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: МИКРОГЕН
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 300 мг/доза
Срок годности: 36.0



Описание

Отпуск иммунобиологического лекарственного препарата ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА и ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ ТЕРМОКОНТЕЙНЕРА, в который помещается лекарственный препарат, доставка данного лекарственного препарата в медицинскую организацию при условии хранения в специальном термоконтейнере не должна превышать срок 48 часов после его приобретения.

Действующее вещество

Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM]

Состав

Действующее вещество: Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgA+IgM] (Immunoglobulin human normal [IgG+IgA+IgM])Концентрация действующего вещества (мг): 300

Форма выпуска

Порошок

Фармакокинетика

Иммуноглобулины и их фрагменты, сохранившие серологическую активность, обнаруживаются как в содержимом толстой кишки, так и в копрофильтратах в течение нескольких суток после приема препарата.

Показания

В составе комплексной терапии при лечении вирусных и бактериальных кишечных инфекций у детей с 1 месяца и взрослых.

Способ применения и дозы

После вскрытия во флакон добавляют 5 мл (1/2 ст. ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Препарат растворяют при легком встряхивании.Применяют внутрь по 1-2 дозе (флакону) 2-3 раза в сутки в зависимости от возраста пациента и тяжести заболевания за 30 минут до еды в течение 5 суток. При необходимости курс лечения повторяют.Препарат нельзя применять при отсутствии на флаконе этикетки или наличии на ней неполных сведений, а также при наличии трещин на флаконах.

Противопоказания

Аллергические реакции на иммуноглобулины человека в анамнезе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Исследований по применению препарата у женщин во время беременности и кормления грудью не проводилось, поэтому КИП беременным и кормящим назначают с осторожностью, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции в виде сыпи. В этом случае прием препарата продолжают на фоне блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение КИП возможно в комплексе с антибиотиками, химиотерапевтическими средствами и бактериофагами.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе оказывает влияния.

Условия хранения

В сухом месте