Инструкция по применению
Кьюлипта Таблетки 10 мг 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Ирландия
Производитель: Эббви Айрлэнд
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Атогепант
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

КЬЮЛИПТА, 10 мг, таблетки Круглые двояковыпуклые таблетки белого или практически белого цвета. На одной стороне выдавлены символы A и 10.

Действующее вещество

Атогепант

Состав

Препарат КЬЮЛИПТА содержит Действующим веществом является атогепант. КЬЮЛИПТА, 10 мг, таблетки Каждая таблетка содержит 10 мг атогепанта. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: коповидон, D-альфа-токоферола макрогола сукцинат, маннитол, целлюлоза микрокристаллическая, натрия хлорид, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат КЬЮЛИПТА показан для профилактического лечения мигрени, возникающей не менее 4 дней в месяц, у взрослых в возрасте от 18 лет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза препарата КЬЮЛИПТА составляет 60 мг в сутки. Лечащий врач может рекомендовать Вам прием меньшей дозы, если Вы принимаете другие лекарственные средства, либо если у Вас есть тяжелые нарушения функции почек. Обратитесь к своему врачу, если Вы находитесь на диализе. Путь и (или) способ введения Внутрь. Таблетки следует принимать не зависимо от приема пищи.

Противопоказания

Не принимайте препарат КЬЮЛИПТА: - если у Вас аллергия на атогепант или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат КЬЮЛИПТА не рекомендуется принимать во время беременности. Неизвестно, проникает ли атогепант в грудное молоко. Ваш врач поможет Вам принять решение либо о прекращении грудного вскармливания, либо об отмене терапии атогепантом, принимая во внимание пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу терапии для Вас. Нет данных

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат КЬЮЛИПТА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Немедленно сообщите врачу, если заметите любую из перечисленных ниже нежелательных реакций, а также если они начнут повторяться или усугубляться: Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10) - тошнота, - запор, - усталость или сонливость, - снижение аппетита. Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно) - признаки аллергической реакции (гиперчувствительность) - сыпь, зуд, крапивница, отек лица. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства - члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата. Российская Федерация 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Телефон: +7 800 550-99-03 Эл. почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru https://roszdravnadzor.gov.ru

Передозировка

Если Вы приняли препарата КЬЮЛИПТА больше, чем следовало Если Вы приняли слишком много таблеток препарата КЬЮЛИПТА, обратитесь к врачу. По возможности покажите врачу упаковку препарата КЬЮЛИПТА. Если Вы забыли принять препарат КЬЮЛИПТА Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, примите её, как только это будет возможно, и затем продолжайте приём как обычно. Если время приема следующей дозы почти наступило, пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Если Вы прекратили прием препарата КЬЮЛИПТА Не прекращайте прием препарата без консультации с врачом. Ваше состояние может ухудшиться, если Вы прекратите приём препарата без консультации с врачом. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это особенно важно, если Вы принимаете: - препараты для лечения инфекций (например, кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, рифампицин), - лекарства, влияющие на Вашу иммунную систему (например, циклоспорин).

Особые указания

Лекарственный препарат подлежит дополнительному мониторингу, который способствует быстрому выявлению новых сведений о безопасности. Это позволит в короткий срок выявить новую информацию о безопасности. Вы можете помочь, сообщая информацию о любых нежелательных реакциях, которые возникли в период применения лекарственного препарата (в том числе и о случаях его неэффективности). Препарат КЬЮЛИПТА содержит натрий КЬЮЛИПТА, 60 мг, таблетки Данный препарат содержит 31,5 мг натрия на одну таблетку. Эго эквивалентно 1,6% рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия для взрослого человека. Препарат КЬЮЛИПТА не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Однако, препарат КЬЮЛИПТА может вызывать сонливость. При появлении какого-либо из этих эффектов прекратите управление автомобилем и не используйте механизмы.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Данный препарат не требует специальных условий хранения.