Инструкция по применению
Кьюлипта 60 мг Таблетки 28 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эббви Айрлэнд
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Атогепант
Количество в упаковке: 28
Дозировка действующего вещества: 60 мг

Действующее вещество

Атогепант

Состав

Действующим веществом является атогепант. Каждая таблетка содержит 60 мг атогепанта. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: коповидон, D-альфа-токоферола макрогола сукцинат, маннитол, целлюлоза микрокристаллическая, натрия хлорид, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, натрия стеарилфумарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат КЬЮЛИПТА показан для профилактического лечения мигрени, возникающей не менее 4 дней в месяц, у взрослых в возрасте от 18 лет.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Рекомендуемая доза препарата КЬЮЛИПТА составляет 60 мг в сутки. Лечащий врач может рекомендовать Вам прием меньшей дозы, если Вы принимаете другие лекарственные средства, либо если у Вас есть тяжелые нарушения функции почек. Обратитесь к своему врачу, если Вы находитесь на диализе. Путь и (или) способ введения Внутрь. Таблетки следует принимать не зависимо от приема пищи. Если Вы забыли принять препарат КЬЮЛИПТА Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, примите её, как только это будет возможно, и затем продолжайте приём как обычно. Если время приема следующей дозы почти наступило, пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Если Вы прекратили прием препарата КЬЮЛИПТА Не прекращайте прием препарата без консультации с врачом. Ваше состояние может ухудшиться, если Вы прекратите приём препарата без консультации с врачом. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Противопоказания

  Не принимайте препарат КЬЮЛИПТА: • если у Вас аллергия на атогепант или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Препарат КЬЮЛИПТА не рекомендуется принимать во время беременности. Неизвестно, проникает ли атогепант в грудное молоко. Ваш врач поможет Вам принять решение либо о прекращении грудного вскармливания, либо об отмене терапии атогепантом, принимая во внимание пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу терапии для Вас.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат КЬЮЛИПТА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Немедленно сообщите врачу, если заметите любую из перечисленных ниже нежелательных реакций, а также если они начнут повторяться или усугубляться: Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10) • тошнота; • запор; • усталость или сонливость; • снижение аппетита. Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно) • признаки аллергической реакции (гиперчувствительность) - сыпь, зуд, крапивница, отек лица. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства - члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата КЬЮЛИПТА больше, чем следовало Если Вы приняли слишком много таблеток препарата КЬЮЛИПТА, обратитесь к врачу. По возможности покажите врачу упаковку препарата КЬЮЛИПТА.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это особенно важно, если Вы принимаете: • препараты для лечения инфекций (например, кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, рифампицин); • лекарства, влияющие на Вашу иммунную систему (например, циклоспорин).

Особые указания

Перед приемом препарата КЬЮЛИПТА проконсультируйтесь с лечащим врачом. Дети и подростки Не давайте препарат детям и подросткам в возрасте до 18 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены. Препарат КЬЮЛИПТА содержит натрий КЬЮЛИПТА, 60 мг, таблетки Данный препарат содержит 31,5 мг натрия на одну таблетку. Это эквивалентно 1,6% рекомендуемой максимальной суточной нормы потребления натрия для взрослого человека. Препарат КЬЮЛИПТА не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Однако, препарат КЬЮЛИПТА может вызывать сонливость. При появлении какого-либо из этих эффектов прекратите управление автомобилем и не используйте механизмы.

Условия хранения

от 2# до 25#