Инструкция по применению
Клабакс таблетки покрытые оболочкой 250мг N12

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Ранбакси
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кларитромицин
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 250 мг

Описание

Таблетки Клабакс оказывают антибактериальное, бактериостатическое, бактерицидное действие.

Действующее вещество

Кларитромицин

Состав

1 табл. содержит кларитромицин 250 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После перорального приема Клабакс быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, биодоступность его составляет 55%. Клабакс является самым кислотоустойчивым макролидом, поэтому прием пищи не влияет на биодоступность. Метаболизируется с образованием активного метаболита 14-гидроксикларитромицина, который обладает выраженной антибактериальной активностью. Период полувыведения Клабакса составляет 3-4 часа, активного метаболита - 7,5-8 часов. Клабакс обладает выраженной способностью к внутриклеточному накоплению: в лимфоцитах, лейкоцитах, макрофагах. Связывание с белками составляет от 42% до 70%. Клабакс обладает длительным постантибиотическим эффектом. После перорального приема основная часть препарата выводится с мочой в неизмененном виде, почечная экскреция 14-ОН кларитромицина составляет 15% от принятой дозы. От 6 до 11% препарата выводится с фекалиями. Фармакокинетика кларитромицина изменяется у лиц с нарушением функции почек, что требует коррекции дозы препарата (См. Дозы и способ применения)

Показания

Инфекции верхних дыхательных путей: ларингиты, тонзиллиты, синуситы и фарингиты. Инфекции нижних дыхательных путей: пневмония (в том числе и атипичная), острый бронхит и обострение хронического бронхита. Кожные инфекции: фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция. Инфекции, вызванные: Chlamydia trachomatis, Helicobacter pylory, Ureaplasma urealyticum, Mycobacterium avium, Mycoplasma spp.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет: Обычно назначают Клабакс по 250 мг дважды в сутки, при тяжелых инфекциях - по 500 мг дважды в сутки. Продолжительность лечения составляет 7-14 дней в зависимости от тяжести инфекции. При нормальной функции печени и почек у пожилых нет необходимости в коррекции дозы. Дети в возрасте от 6 месяцев до 12 лет: доза составляет 7,5 мг на кг тела/сутки. Максимальная суточная доза 500 мг.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к кларитромицину, эритромицину или другому антибиотику из группы макролидов в анамнезе.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения кларитромицина во время беременности и кормления грудью не установлена.

Побочные действия

Со стороны ЖКТ: тошнота, диарея, боль в животе, стоматит, нарушение вкуса, транзиторное повышение уровня печеночных трансаминаз сыворотки крови. Аллергические реакции: крапивница, кожная сыпь. Со стороны ЦНС: тревога, головокружение, бессонница, галлюцинации и спутанность сознания. Прочие: тромбоцитопения

Передозировка

Прием большой дозы кларитромицина может вызвать аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства. При передозировке проводится промывание желудка и симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное использование кларитромицина с теофиллином, карбамазепином, терфенадином, варфарином, зидовудином, дигоксином может сопровождаться повышением уровней этих препаратов в плазме.