Инструкция по применению
Кларидол сироп 1 мг/мл 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: Шрея
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоратадин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг
Срок годности: 36

Действующее вещество

Лоратадин

Состав

Лоратадин 1 мг.; Вспомогательные вещества: натрия метилпарабен, натрия пропилпарабен, сахароза, пропиленгликоль, лимонная кислота, сорбит раствор, натрия сахарин, натрия бензоат, динатрия эдетат, краситель солнечный закат, смешанная фруктовая отдушка, американское мороженое, вода очищенная.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Всасывание;После приема внутрь препарат быстро и полностью абсорбируется из ЖКТ. Прием пищи замедляет время достижения Cmax, в среднем, на 1 ч при применении таблеток и не влияет на абсорбцию препарата при применении сиропа. Cmax лоратадина достигается через 1.3-2.5 ч после приема.; Распределение; Связывание с белками плазмы - 97%. Не проникает через ГЭБ. Css лоратадина и его активного метаболита достигается на 5-й день применения.; Метаболизм; Метаболизируется в печени изоферментами CYP3A4 и в меньшей степени CYP2D6 с образованием активного метаболита - дезкарбоэтоксилоратадина.; Выведение;T1/2 лоратадина составляет 3-20 ч (в среднем 8.4 ч), дезкарбоэтоксилоратадина - 8.8-92 ч (в среднем около 28 ч). Лоратадин выводится с мочой и желчью.; Фармакокинетика в особых клинических случаях;У пациентов пожилого возраста Cmax возрастает на 50%, у пациентов с алкогольным поражением печени - с увеличением тяжести заболевания.; T1/2 лоратадина у пациентов пожилого возраста составляет 6.7-37 ч (в среднем 18.2 ч), дезкарбоэтоксилоратадина - 11-38 ч (в среднем 17.5 ч).; При алкогольном поражении печени T1/2 лоратадина возрастает с увеличением тяжести заболевания.; У пациентов с хронической почечной недостаточностью и при проведении гемодиализа фармакокинетика лоратадина практически не меняется.

Показания

— сезонный и круглогодичный аллергический ринит; — аллергический конъюнктивит; — поллиноз; — крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая крапивница); — аллергические зудящие дерматозы; — псевдоаллергические реакции; — аллергические реакции на укусы насекомых; — зуд различной этиологии; — отек Квинке.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь.; Взрослым (в т.ч. пожилым) и детям старше 12 лет назначают по 10 мг (1 таб. или 2 чайн. л. сиропа) 1 раз/сут. Суточная доза - 10 мг.; Детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела <30 кг назначают по 5 мг (1/2 таб. или 1 чайн.л. сиропа) 1 раз/сут. Суточная доза - 5 мг.; Детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела >30 кг назначают по 10 мг (1 таб. или 2 чайн. л. сиропа) 1 раз/сут. Суточная доза - 10 мг.; Применение сиропа у детей младше 2-х лет не рекомендуется.; Пациентам с нарушением функции печени Кларидол следует назначать в начальной дозе 5 мг/сут в связи с возможным нарушением клиренса лоратадина.

Противопоказания

— беременность; — лактация (грудное вскармливание); — детский возраст до 2-х лет (для сиропа); — повышенная чувствительность к компонентам препарата.; С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушениями функции печени (в частности, с печеночной недостаточностью).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, сонливость, возбудимость или вялость (у детей).; Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, рвота, гастрит, нарушение функции печени.; Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, тахикардия.; Прочие: аллергические реакции (в т.ч. сыпь, анафилаксия), кашель, алопеция.; Нежелательные явления при применении лоратадина встречались с той же частотой, что и при применении плацебо (≥2%).

Передозировка

Симптомы: сонливость, тахикардия, головная боль.; Лечение: промывание желудка, индуцирование рвоты, назначение активированного угля. При необходимости проводят симптоматическую терапию.;

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении Кларидола с эритромицином, циметидином, кетоконазолом возможно увеличение концентрации лоратадина в плазме крови (что не имеет клинического значения и не оказывает влияния на ЭКГ).; Индукторы микросомального окисления (фенитоин, барбитураты, зиксорин, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) и этанол снижают эффективность лоратадина.

Особые указания

С осторожностью следует назначать препарат при печеночной недостаточности.; Использование в педиатрии;Применение сиропа у детей младше 2-х лет не рекомендуется.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей