Инструкция по применению
Кларисенс Таблетки 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоратадин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Действующее вещество

Лоратадин

Состав

Лоратадин 10 мг. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, тальк, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит, отек Квинке, крапивница (в т.ч. Хроническая идиопатическая), аллергические реакции на укусы насекомых, зудящие аллергические дерматозы (в т.ч. Хроническая экзема, контактный дерматит).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 10 мг (1 таб. или 10 мл сиропа) 1 раз /сут. Детям в возрасте от 2 до 12 лет при массе тела менее 30 кг – по 5 мг (1/2 таб. или 5 мл) 1 раз/сут, при массе тела более 30 кг – по 10 мг (1 таб. или 10 мл сиропа) 1 раз/сут. Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

Противопоказания

фенилкетонурия (для сиропа), детский возраст до 2 лет, беременность, период лактации (грудного вскармливания), повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует назначать препарат при печеночной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Нежелательные эффекты, перечисленные ниже, отмечались с частотой &#8805 . 2% и приблизительно с той же частотой, что и при приеме плацебо. Со стороны ЦНС: у взрослых – головная боль, утомляемость, сонливость; У детей – головная боль, нервозность, седативное действие. Со стороны пищеварительной системы: у взрослых – сухость во рту, тошнота, гастрит, нарушение функции печени. Со стороны сердечно-сосудистой системы: у взрослых - сердцебиение, тахикардия. Аллергические реакции: у взрослых - сыпь, анафилаксия. Прочие: алопеция (у взрослых).

Особые указания

Нежелательные эффекты, перечисленные ниже, отмечались с частотой &#8805 . 2% и приблизительно с той же частотой, что и при приеме плацебо. Со стороны ЦНС: у взрослых – головная боль, утомляемость, сонливость; У детей – головная боль, нервозность, седативное действие. Со стороны пищеварительной системы: у взрослых – сухость во рту, тошнота, гастрит, нарушение функции печени. Со стороны сердечно-сосудистой системы: у взрослых - сердцебиение, тахикардия. Аллергические реакции: у взрослых - сыпь, анафилаксия. Прочие: алопеция (у взрослых). Прочие: алопеция (у взрослых).