Инструкция по применению
Кларисенс Таблетки 10 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лоратадин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг
Срок годности: 24



Действующее вещество

Лоратадин

Состав

Лоратадин 10 мг.Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, тальк, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

ВсасываниеБыстро и полностью всасывается из ЖКТ. Время достижения Cmax – 1.3-2.5 ч. Прием пищи замедляет время достижения Cmax на 1 ч. РаспределениеСвязывание с белками плазмы – 97%. Css лоратадина и его метаболита достигается на 5 сутки приема. Не проникает через ГЭБ.МетаболизмМетаболизируется в печени с образованием активного метаболита дескарбоэтоксилоратадина при участии ферментов CYP3A4 и в, меньшей степени, CYP2D6.ВыведениеT1/2 лоратадина – 3-20 ч (в среднем 8.4 ч), активного метаболита – 8.8-92 (в среднем 28 ч).Выводится с мочой и желчью.Фармакокинетика в особых клинических случаяхCmax возрастает у пожилых пациентов на 50%, T1/2 лоратадина составляет 6.7-37 ч (в среднем 18.2 ч), активного метаболита – 11-38 (в среднем 17.5 ч).При алкогольном поражении печени Cmax и T1/2 возрастают в соответствии с увеличением тяжести заболевания.У пациентов с хронической почечной недостаточностью и при проведении гемодиализа фармакокинетика практически не меняется.

Показания

— сезонный и круглогодичный аллергический ринит и конъюнктивит;— отек Квинке;— крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая);— аллергические реакции на укусы насекомых;— зудящие аллергические дерматозы (в т.ч. хроническая экзема, контактный дерматит).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 10 мг (1 таб. или 10 мл сиропа) 1 раз /сут.Детям в возрасте от 2 до 12 лет при массе тела менее 30 кг – по 5 мг (1/2 таб. или 5 мл) 1 раз/сут, при массе тела более 30 кг – по 10 мг (1 таб. или 10 мл сиропа) 1 раз /сут.Препарат принимают внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

Противопоказания

— фенилкетонурия (для сиропа);— детский возраст до 2 лет;— беременность;— период лактации (грудного вскармливания);— повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью следует назначать препарат при печеночной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Нежелательные эффекты, перечисленные ниже, отмечались с частотой ≥2% и приблизительно с той же частотой, что и при приеме плацебо.Со стороны ЦНС: у взрослых – головная боль, утомляемость, сонливость; у детей – головная боль, нервозность, седативное действие.Со стороны пищеварительной системы: у взрослых – сухость во рту, тошнота, гастрит, нарушение функции печени.Со стороны сердечно-сосудистой системы: у взрослых - сердцебиение, тахикардия.Аллергические реакции: у взрослых - сыпь, анафилаксия.Прочие: алопеция (у взрослых).

Передозировка

Симптомы: сонливость, тахикардия, головная боль.Лечение: индукция рвоты, промывание желудка, прием активированного угля, проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Этанол снижает эффективность лоратадина.Эритромицин, циметидин, кетоконазол увеличивают концентрацию лоратадина в плазме крови, не вызывая клинических проявлений и не влияя на ЭКГ.Индукторы микросомального окисления (фенитоин, барбитураты, зиксорин, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) снижают эффективность лоратадина.

Особые указания

При печеночной недостаточности препарат назначают через день.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Беречь от детей