Инструкция по применению
Кларитромицин-Вертекс капсулы 250 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кларитромицин
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 250 мг



Действующее вещество

Кларитромицин

Состав

В 1 капсуле содержится: 0.25г кларитромицина.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Бактериальные инфекции, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции верхних дыхательных путей (ларингит, фарингит, тонзиллит, синусит), нижних отделов дыхательных путей (бронхит, пневмония, атипичная пневмония), кожи и мягких тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция), средний отит. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, микобактериоз, хламидиоз.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослые и дети старше 12 лет - по 250-500 мг 2 раза в сутки. Длительность лечения - 6-14 дней. При тяжелом течении инфекций или в случае затруднения перорального применения назначают в виде в/в инъекций в дозе 500 мг/сут в течение 2-5 дней, с дальнейшим переводом на пероральный прием 500 мг/сут. Общая длительность лечения составляет 10 дней. При лечении инфекций, вызванных Mycobacterium avium, синуситах, а также тяжелых инфекциях (в т.ч. вызванных Haemophilus influenzae) назначаютВнутрь, по 0.5-1 г 2 раза в день (максимально - 2 г). Длительность лечения - 6 мес и более. Детям назначается в виде суспензии в дозе 7.5 мг/кг каждые 12 ч. Максимальная суточная доза - 500 мг. Длительность лечения - 7-10 дней. У больных с ХПН (КК менее 30 мл/мин или концентрации сывороточного креатинина более 3.3 мг/100 мл) - 250 мг/сут (однократно), при тяжелых инфекциях - по 250 мг 2 раза в сутки. Максимальная длительность лечения у пациентов этой группы - 14 дней.

Противопоказания

Гиперчувствительность, порфирия, беременность (I триместр), период лактации, одновременный прием цизаприда, пимозида, терфенадина.С осторожностью. Почечная и/или печеночная недостаточность.

Побочные действия

Со стороны нервной системы головная боль, головокружение, тревожность, страх, бессонница, кошмарные сновидения. редко - дезориентация, галлюцинации, психоз, деперсонализация, спутанность сознания.Со стороны пищеварительной системы тошнота, рвота, гастралгия, диарея, стоматит, глоссит, повышение активности печеночных трансаминаз, холестатическая желтуха, редко - псевдомембранозный энтероколит.Со стороны органов чувств шум в ушах, изменение вкуса (дисгевзия). в единичных случаях - потеря слуха, проходящая после отмены препарата.Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза редко - тромбоцитопения (необычные кровотечения, кровоизлияния).Аллергические реакции кожная сыпь, зуд, злокачественная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), анафилактоидные реакции.Прочие развитие устойчивости микроорганизмов. Передозировка. Симптомы нарушение функции ЖКТ, головная боль, спутанность сознания.Лечение промывание желудка, симптоматическая терапия.