Инструкция по применению
Клей БФ-6 раствор для наружного применения 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенол
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Фенол

Состав

Раствор модификации фенолоформальдегидной - смолы, поливинилбутираля и канифоли, пластифицированный пластификатором.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Клей БФ-6 применяют для обработки микротравм - ссадин, царапин, порезов и других мелких повреждений кожи, а также для покрытия корня зуба при хирургическом лечении околокорневых зубных очагов инфекции: кист, гранулем.

Способ применения и дозы

Клей БФ-6 применяют местно для взрослых и детей Детям до года применение Клея БФ-6 не рекомендуется. Перед нанесением клея БФ-6 участок кожи тщательно очищают от загрязнений. Ватным или марлевым тампоном останавливают кровотечение и подсушивают место, подлежащее покрытию клеем. Последний наносят на кожу тонким равномерным слоем до полного покрытия участка повреждения и прилежащих неповрежденных тканей (повязку не накладывают). В случае нарушения целостности пленки поверх нее наносят новую пленку. При хирургическом лечении околокорневых очагов инфекции корень зуба тщательно очищают от грануляции и оболочки кисты, останавливают кровотечение, подсушивают и покрывают клеем часть корня зуба, выступающую в дефект костной ткани челюсти, не допуская затекания клея на кость. Через 1 - 2 минуты рану обсушивают, следя за заполнением околокорневого дефекта челюсти кровяным сгустком. Дальнейшее ведение послеоперационного периода обычное. Пленка образуется в течение 2 - 5 минут после нанесения БФ-6 и прочно удерживается на коже в течение 2 - 3 дней, а на верхушке корня зуба до 7 суток.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата. Детский возраст до 1 года.

Побочные действия

Жжение в месте нанесения, аллергические реакции.