Инструкция по применению
Кленбутерол Сироп 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Болгария
Производитель: Софарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Кленбутерол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Кленбутерол

Состав

1 мл:Кленбутерола гидрохлорид 1 мкг.Вспомогательные вещества: сорбитол - 280 мг, глицерол - 200 мг, пропиленгликоль - 100 мг, натрия цитрата дигидрат - 5.8 мг, лимонной кислоты моногидрат - 7 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.45 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.05 мг, бутилпарагидроксибензоат - 0.05 мг, натрия бензоат - 1.2 мг, малиновая эссенция - 0.45 мг, этанол 96% - 5 мг, вода очищенная - до 1 мл.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Всасывание и распределениеКленбутерол относительно быстро всасывается в ЖКТ. Связь с белками плазмы составляет 89-98%.Метаболизм и выведениеБиологический T1/2 составляет 3.5 ч. Выводится в основном через почки в виде сульфоконъюгированных производных.

Показания

- бронхиальная астма;- хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь.Суточная доза для детей от 6 до 12 лет (масса тела 22-35 кг) - 15 мкг (за 2 приема).Взрослые и дети старше 12 лет: 2 раза в сутки по 10-20 мкг. Поддерживающая доза - 2 раза по 10 мкг.Длительность курса лечения препаратом Кленбутерол составляет 2-3 дня, до снятия острых симптомов заболевания. Длительность поддерживающей терапии не должна превышать 7 дней. Решение о лечении в течение периода, превышающего семидневный срок, принимает лечащий врач.

Противопоказания

- тиреотоксикоз;- гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия;- закрытоугольная глаукома;- феохромоцитома;- тахиаритмия;- инфаркт миокарда (острый период);- беременность (I и III триместр);- период лактации;- детский возраст до 6 лет;- гиперчувствительность к действующему или к какому-либо из вспомогательных веществ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Кленбутерол сироп не применяют в течение первых трех месяцев беременности, а также в течение последнего триместра из-за подавляющего действия на родовую деятельность. Кленбутерол сироп не применяют в период кормления грудью. Во втором триместре беременности и в период кормления грудью рекомендуется применение ингаляторной формы кленбутерола.

Побочные действия

Мышечная система: мелкий тремор мышц.ЦНС: беспокойство, головная боль. Сердечно-сосудистая система: снижение или повышение артериального давления, тахикардия, ангинапьные боли, желудочковая экстрасистолия.Кожа и слизистые оболочки: кожная сыпь, отек лица, крапивница.Кровеносная система: тромбоцитопения, гипогликемия.ЖКТ: гастрит, диарея, сухость во рту, тошнота. Мочеполовая система: нарушение мочеиспускания.Описанные побочные реакции проходят без прекращения лечения, через 1-2 недели после его начала.

Передозировка

Симптомы: тремор пальцев рук, повышение потоотделения, головная боль, тахикардия. В особенно тяжелых случаях передозировки этого препарата возможны коллапс, судороги и кома.Неотложные меры: во всех случаях передозировки прием кленбутерола прекращают. Делают промывание желудка, вводят активированный уголь, проводят форсированный диурез и начинают симптоматическое лечение. Применение сиропа кленбутерола в дозах, превышающих рекомендуемые, может привести к ухудшению течения бронхиальной астмы. В подобных случаях необходима немедленная консультация с врачом и, при необходимости, госпитализация.

Взаимодействие с другими препаратами

Бета-адреноблокаторы подавляют действие Кленбутерола, и при их одновременном приеме существует риск развития бронхоспазма.Применение препарата одновременно с гипогликемическими средствами уменьшает их действие. Кленбутерол усиливает действие и побочные эффекты бета-адреномиметиков, теофиллина и антихолинергических средств.При одновременном применении кленбутерола и галогенированных углеводородов для наркоза (при манипуляциях и вмешательствах) существует повышенный риск появления аритмии.Кленбутерол можно применять одновременно с диуретиками и сердечными гликозидами, но при периодическом контроле сывороточных электролитов.При одновременном применении с ингибиторами моноаминооксидазы (трициклическими антидепрессантами) возможны нарушения сердечного ритма.

Особые указания

Препарат содержит в качестве вспомогательных веществ так называемые парабены: метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать крапивницу и контактный дерматит (аллергические реакции замедленного типа). Редко могут возникнуть аллергические реакции немедленного типа (бронхоспазм). Препарат содержит в качестве вспомогательного вещества глицерол, который при высоких дозах может вызвать головную боль, раздражение желудка и диарею. Препарат содержит 0.63 об.% этилового спирта. Каждая доза содержит 0.005 г алкоголя в 1 мл. Представляет опасность для людей с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, поражениями или заболеваниями мозга, а также для беременных и детей. Может усилить действие других лекарственных средств. Лекарственный препарат не подходит для пациентов с врожденной непереносимостью фруктозы из-за наличия в нем сорбитола.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиВ первые дни лечения кленбутерол может вызвать небольшой тремор и беспокойство, что требует повышенной осторожности при вождении автомобиля и работе с техникой.

Условия хранения

В сухом месте