# Инструкция по применению
# Климаксан Гранулы гомеопатические 10 г

## Характеристики




Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гранулы Cimicifuga racemosa (Цимицифуга рацемоза) C200, Apis (Апис) C200, Lachesis (Лахезис) C50
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

## Описание

Однородные гранулы шаровидной формы от белого до почти белого цвета.

## Действующее вещество

Гранулы Cimicifuga racemosa (Цимицифуга рацемоза) C200, Apis (Апис) C200, Lachesis (Лахезис) C50

## Форма выпуска

Гранулы

## Показания

В качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, «приливы»).

## Способ применения и дозы

На один прием – 5 гранул (держать во рту до полного растворения – не во время приема пищи), принимать 2 раза в день, утром и вечером. В зависимости от тяжести симптомов возможно увеличение приема препарата до 3-4 раз в день. Рекомендуемая длительность применения препарата составляет 6 месяцев. Возможно проведение повторных курсов лечения по рекомендации врача.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности применения препарата у данной категории пациентов).

**Особые указания**

В период проведения курса лечения препаратом рекомендуется не реже 1 раза в 2 месяца консультироваться с лечащим врачом в целях возможной коррекции терапии. Информация для пациентов с сахарным диабетом: разовая доза препарата (5 гранул) содержит приблизительно 0,3 г сахарозы, что соответствует 0,03 хлебным единицам (ХЕ), максимальная суточная доза препарата (20 гранул) содержит приблизительно 1,2 г сахарозы, что соответствует 0,12 хлебным единицам (ХЕ). При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

**Условия хранения**

Беречь от детей