Инструкция по применению
Климаксан гомеопатический Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гранулы Cimicifuga racemosa (Цимицифуга рацемоза) C200, Apis (Апис) C200, Lachesis (Лахезис) C50
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Гранулы Cimicifuga racemosa (Цимицифуга рацемоза) C200, Apis (Апис) C200, Lachesis (Лахезис) C50

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, «приливы»).

Способ применения и дозы

На один прием – 1 таблетку (держать во рту до полного растворения – не во время приема пищи), принимать 2 раза в день, утром и вечером. В зависимости от тяжести симптомов возможно увеличение приема препарата до 3-4 раз в день.
Рекомендуемая длительность применения препарата составляет 6 месяцев. Возможно проведение повторных курсов лечения по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период грудного вскармливания, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат Климаксан® гомеопатический противопоказан к применению у женщин в период беременности и грудного вскармливания.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом следует помнить, что 1 таблетка препарата содержит 0,2136 г лактозы, что соответствует 0,018 хлебным единицам (ХЕ). Максимальная суточная доза препарата составляет 4 таблетки, что соответствует 0,072 ХЕ. В период проведения курса лечения препаратом рекомендуется не реже 1 раза в 2 месяца консультироваться с лечащим врачом в целях возможной коррекции терапии. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте