Инструкция по применению
Клопидогрел Таблетки 75 мг 90 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Клопидогрел
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 75 мг
Срок годности: 24

Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от розового до розовато-коричневого цвета. На поперечном разрезе видны два слоя: ядро от белого до белого со светло-коричневым или желтоватым оттенком цвета. Допускается шероховатость поверхности таблеток.

Действующее вещество

Клопидогрел

Состав

1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: _Действующее вещество:_ клопидогрела гидросульфат (в пересчете на клопидогрел - 75 мг) - 97,875 мг. _Вспомогательные вещества:_ лактозы моногидрат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, целлюлоза микрокристаллическая 102, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кроскармеллоза натрия, магния стеарат. _Вспомогательные вещества оболочки:_ опадрай® II розовый (32K14834) \[лактозы моногидрат, HPMC 2910/гипромеллоза, титана диоксид, триацетин, краситель оксид железа красный\].

Форма выпуска

Таблетки

Противопоказания

\- Повышенная чувствительность к клопидогрелу или любому из вспомогательных веществ препарата. \- Тяжелая печеночная недостаточность. \- Острое кровотечение, например, кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние. \- Редкая наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция. \- Беременность и период грудного вскармливания (см. раздел «Беременность и период грудного вскармливания»). \- Детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены).

Передозировка

Симптомы передозировки Передозировка клопидогрела может вести к увеличению времени кровотечения с последующими осложнениями в виде развития кровотечений. _Меры по оказанию помощи при передозировке_ При появлении кровотечения требуется проведение соответствующих лечебных мероприятий. Антидот клопидогрела не установлен. Если необходима быстрая коррекция удлинившегося времени кровотечения, то рекомендуется проведение переливания тромбоци- тарной массы.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.