Инструкция по применению
Коделак Бронхо Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 20 мг+ 30 мг+ 10 мг+ 200 мг
Срок годности: 24

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки светлого желтовато-серого цвета с темными и светлыми вкраплениями, с фаской и риской.

Действующее вещество

Амброксол+Натрия глицирризинат+Тимьяна ползучего травы экстракт

Состав

Действующие вещества: амброксола гидрохлорид (амброксол) – 20,0 мг, натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты) – 30,0 мг, термопсиса ланцетного травы экстракт – 10,0 мг, натрия гидрокарбонат – 200,0 мг.
Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 84,30 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 150,10 мг, повидон (поливинилпирролидон, повидон К25) – 26,40 мг, тальк – 13,00 мг, стеариновая кислота – 5,20 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (крахмала натрия гликолят) – 11,00 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Амброксол. После приема внутрь амброксол быстро и практически полностью абсорбируется из желудоч-но-кишечного тракта. Максимальная концентрация (Cmax) в плазме крови при пероральном приеме достигается через 1–3 ч. Объем распределения составляет 552 л. В терапевтическом ин-тервале концентраций связывание с белками плазмы составляет 80-90 %. Самые высокие кон-центрации активного компонента препарата наблюдаются в легких. Амброксол проникает че-рез плацентарный и гематоэнцефалический барьеры, выделяется с грудным молоком. Пример-но 30 % принятой пероральной дозы подвергается эффекту первичного прохождения через пе-чень. Исследования на микросомах печени человека показали, что изофермент CYP3A4 являет-ся преобладающей изоформой, ответственной за метаболизм амброксола до дибромантранило-вой кислоты. Оставшаяся часть амброксола метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием фармакологически неактивных метаболитов. Терминальный период полу выве-дения (T1/2) амброксола из плазмы крови составляет 10 часов. Общий период полувыведения амброксола и его метаболитов составляет около 22 ч. Выводится почками: 90 % в виде метабо-литов, 10 % в неизмененном виде. Не обнаружено клинически значимого влияния возраста и пола на фармакокинетику амброксо-ла, поэтому нет оснований для – подбора дозировки по этим признакам. Натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты). После перорального приема, в кишечнике под влиянием фермента #-глюкуронидазы, продуци-руемого бактериями нормальной микрофлоры, из глицирризиновой кислоты образуется актив-ный метаболит - #-глицирретовая кислота, которая всасывается в системный кровоток. В крови #-глицирретовая кислота связывается с альбумином и практически полностью транспортирует-ся в печень. Выделение #-глицирретовой кислоты происходит преимущественно с желчью, в остаточном количестве – с мочой. Экстракт травы тимьяна ползучего (чабреца). Действие препарата является результатом совокупного действия активных веществ экстракта травы тимьяна ползучего (чабреца), поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным, все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания

Заболевания дыхательных путей с затруднением отхождения мокроты: острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктатическая болезнь.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время приема пищи. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в сутки. Не рекомендуется применять без врачебного назначения более 4-5

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции. Редко – слабость, головная боль, диарея, сухость во рту и дыхательных путях, экзантемы, ринорея, запор, дизурия. При длительном приеме в высоких дозах – гастралгия, тошнота, рвота.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея, диспепсия. Лечение симптоматическое, промывание желудка целесообразно в первые 1-2 часа после приема препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение с противокашлевыми лекарственными средствами приводит к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. Препарат увеличивает проникновение в бронхиальный секрет антибиотиков.

Особые указания

Совместное применение с противокашлевыми лекарственными средствами приводит к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. Не комбинировать с противокашлевыми средствами. Препарат увеличивает проникновение в бронхиальный секрет антибиотиков.

Условия хранения

В сухом месте